小兒藥證眞訣
顱顖經

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

小兒藥證眞訣

錢乙撰

本館叢書集成初編所選
聚珍版叢書及惜陰軒叢
書皆收有此書聚珍在前
故據以排印

原序

醫之爲藝誠難矣。而治小兒爲尤難。自六歲以下。黃帝不載其說。始有顱顬經。以占壽夭死生之候。則小兒之病。雖黃帝猶難之。其難一也。脈法雖曰八至爲和平。十至爲有病。然小兒脈微難見。醫爲持脈。又多驚啼。而不得其審。其難二也。脈既難憑。必資外證。而其骨氣未成。形聲未正。悲啼喜笑。變態不常。其難三也。問而知之。醫之工也。而小兒多未能言。言亦未足取信。其難四也。臟腑柔弱。易虛易實。易寒易熱。又所用多犀珠龍麝。醫苟難辨。何以已疾。其難五也。種種隱奧。其難固多。余嘗致思于此。又目見庸醫妄施方藥。而救之者十常四五。良可哀也。蓋小兒治法。散在諸書。又多出于近世臆說。汗漫難據。求其要妙。豈易得哉。太醫丞錢乙字仲陽。汶上人。其治小兒。該括古今。又多自得。著名于時。其法簡當精審。如指諸掌。先子治平中登第。調須城尉。識之。余五六歲時。病驚疳癖痕。屢至危殆。皆仲陽拯之。良愈。是時仲陽年高。少不肯輕傳其書。余家所傳者。纔十餘方耳。大觀初。余筮仕汝海。而仲陽老矣。于親舊間。始得說本數十條。後六年又得雜方。蓋晚年所得益妙。比于京師復見別本。然旋著旋傳。皆雜亂。初無紀律。互有得失。閱得參校焉。其先後則次之。重複則削之。訛謬則正之。俚語則易之。上卷脈證治法。中卷記嘗所治病。下卷諸方。而書以全。于是古今治小兒之法。不可以加矣。余念博愛者。仁者之用心。幼幼者。聖人之遺訓。此惠可不廣耶。將傳之好事者。使幼者免橫夭之苦。老者無哭子之悲。此余之志也。因以明仲陽之術于無窮。宣

教郎大梁閻季忠序.

錢乙傳

錢乙字仲陽。上世錢塘人。與吳越王有屬。俶納土。曾祖贇隨以北。因家于鄆。父顗。善鍼。醫然嗜酒喜游。一旦匿姓名。東游海上。不復返。乙時三歲。母前亡。父同產姑。嫁醫呂氏。哀其孤。收養爲子。稍長。讀書。從呂君問醫。呂將歿。乃告以家世。乙號泣請往跡父。凡五六返。乃得所在。又積數歲。乃迎以歸。是時乙年三十餘。鄉人驚嘆感慨。爲泣下。多賦詩詠其事。後七年。父以壽終。喪葬如禮。其事呂君猶事父。呂君歿。無嗣。爲之行葬服。嫁其孤女。歲時祭享。皆與親等。乙始以顱顖方著山東。元豐中。長公主女有疾。召使視之。有功。奏授翰林醫學。賜緋。明年。皇子儀國公病瘈瘲。國醫未能治。長公主朝因言錢乙起草野。有異能。立召入。進黃土湯而愈。神宗皇帝召見褒諭。且問黃土所以愈疾狀。乙對曰。以土勝水。水得其平。則風自止。且諸醫所治垂愈。小臣適當其愈。天子悅其對。擢太醫丞。賜紫衣金魚。自是戚里貴室。逮士庶之家。願致之無虛日。其論醫。諸老宿莫能持難。俄以病免。哲宗皇帝復召宿直禁中。久之。復辭疾。賜告。遂不復起。乙本有羸病。性簡易。嗜酒。疾屢攻。自以意治之。輒愈。最後得疾。憊甚。乃嘆曰。此所謂周痺也。周痺入臟者死。吾其已夫。已而曰。吾能移之。使病在末。因自製藥。日夜飲之。人莫見其方。居亡何。左手足攣不能用。乃喜曰。可矣。又使所親登東山。視菟絲所生。篝火燭其下。火滅。屨劇之。果得伏苓。其大如斗。因以法啜之。閱月而盡。繇此雖偏廢。而氣骨堅悍。如無疾者。退居里舍。杜門不冠履。坐臥一榻上。時時閱史記雜說。客至。酌酒劇談。

意欲之適則使二僕夫輿之出沒閭巷人或邀致之不肯往也病者日造門或扶攜襁褓負曩纍滿前近自鄰井遠或數十里皆授之藥致謝而去初長公主女病泄痢將殆乙方醉曰當發疹而愈駙馬都尉以爲不然怒責之不對而退明日疹果出尉喜以詩謝之廣親宗室子病診之曰此可無藥而愈顧其幼曰此兒旦夕暴病驚人後三日過午無恙其家恚曰幼何疾醫貪利動人乃如此明日果發癍甚急復召乙治之三日愈問何以無疾而知曰火急直視心與肝俱受邪過午者心與肝所用時當更也宗室王子病嘔泄醫以藥溫之加喘乙曰病本中熱脾且傷奈何以劇劑燥之將不得前後溲與石膏湯王與醫皆不信罷謝乙曰毋庸復召我後二日果來召適有故不時往王疑且怒使人十數輩趣之至曰固石膏湯證也竟如言而效有士人病咳面青而其氣喉喉乙曰肝乘肺此逆候若秋得之可治今春不可治其家祈哀強之與藥明日曰吾藥再瀉肝而不少卻三補肺而益虛又加唇白法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尙能粥居五日而絕有娠婦得疾醫言胎且墮乙曰娠者五藏傳養率六旬乃更能候其月遍補之可不墮已而子母皆得全又乳婦因大恐而病病雖愈目張不得瞑久不能曉以問乙乙曰炙郁李酒飲之使醉卽愈所以然者目係內連肝膽恐則氣結膽衝不下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下目則能瞑矣如言而效一日過所善翁聞兒嘐愕曰何等兒聲翁曰吾家孿生二男子也乙曰謹視之過百日乃可保翁不懌居月餘皆斃乙爲方博達不名一師所治種種皆通非但小兒醫也予書無不閱他人斬斬守古獨度越縱舍卒與法合尤遂本草多識物理辨正闕誤人或得異藥或持疑事問之必爲言

出生本末。物色名貌。退而考之。皆中末年。擊痺浸劇。其嗜酒喜寒食。皆不肯禁。自診知不可爲。召親戚訣別。易衣待盡。享年八十二。終于家。所著書。有傷寒論指微五卷。嬰孺論百篇。一子早世。二孫今現爲醫。劉跂曰。乙非獨其醫可稱也。其篤行似儒。其奇節似俠。術盛行而身隱約。又類夫有道者。數謂余言曩學六元五運。夜宿東平王家嶺。觀氣象至逾月不寐。今老且死。事誠有不在書者。肯以三十日暇。從我。當相授。余笑謝弗能。是後遂不復言。嗚呼。斯人也。如欲復得之。難哉。沒後余聞其所治驗尤衆。東州人人能言之。掇其章章者著之篇。異時史家序方術之士。其將有攷焉。宣和元年劉跂撰。

目錄

卷一

變蒸論　脈法論　驚癎發搐論　五癎論
慢驚論　急慢驚論　心論　肝論
脾胃論　肺論　腎論　別虛實證論
諸疳論　腹中有癖不食論　腹脹論　黃疸論
傷風論　傷風吐瀉論　嘔吐論　初生吐不止論
吐痰涎論　欬嗽論　風溫潮熱相似論　諸汗論
熱渴論　身熱論　積痛論　心痛論
蟲痛論　胎實論　胎肥論　胎怯論
夜啼論　驚啼論　食乳論　顱顖不合論
龜胸論　龜背論　行遲論　弄舌舒舌論
齒落不生論　目論　傷寒瘡疹同異論　瘡疹候論
瘡疥風癬論　不治證論

卷二
搐別眞假　發搐順逆　吐瀉爭功
吐瀉問難　虛實下藥　潮熱問難　補下不同
癖爲潮熱　虛實熱證　寒熱相反　預說驚疾
溫冷用藥　陰痼壞病　熱不可下　用藥識證
病洪用巫　病篤訣　治病有等　蟲痛決死
瘡疹標本　瘡疹有誤　啾痛決死
卷三
地黃丸　當歸散　調中丸　場氣丸
大靑膏　敗毒散　玉露散　異功散
荳蔻散　木瓜丸　香銀丸　藿香散
辰砂丸　麻黃湯　生黃膏　木香丸
胡黃連丸　蘭香丸　白粉散　如聖丸
膽礬丸　靑金丹　止汗散　香瓜丸
黃耆散　虎杖散　郁李仁丸　捻頭散

生犀散
梔豉飲子
瀉心湯
紫霜丸
麝蟾丸
荳卷散
羌活膏
金箔丸
瀉白散
瀉青丸
牛黃膏
軟金丹
翦刀股丸
三聖丸
褊銀丸
三黃丸
白虎湯
導赤散
珍珠丸
安蟲散
龍腦散
溫白丸
蟬花散
益黃散
生犀散
牛黃丸
鉤藤膏
烏藥散
小青丸
百部丸
大黃圓
犀角圓
桃枝圓
消堅丸
五色丸
迴生散
蓴蘞湯
安神丸
瀉黃散
秦艽散
銀液丸
魏香散
紫草散
小紅丸
銀砂丸
龍腦膏
大黃丸
白餅子
鐵粉丸
鉤藤飲子
梓朴散
小惺惺丸
天南星散
白朮散
地骨皮散
鎭心丸
涼驚丸
蟬蛻丸
小黃丸
溫中丸

二氣散　白附子香連丸　荳蔻香連丸　小香連丸
大胡連丸　麝香丸　大惺惺丸　獨活飮子
三黃散　人參散　檳榔散　黃耆散
地骨皮散　龍骨散　蘭香散　傅齒立效散
胡黃連麝香丸　大蘆會丸　檢仁丸　橘連丸
龍粉丸　二聖丸　沒石子丸　金華散
蚵蛾丸　白玉散

臣等謹按小兒藥證眞訣三卷宋大梁閻季忠所編錢乙方論也乙字仲陽東平人官至太醫院丞事跡具宋史方技傳乙在宣和間以巫方氏顱顬經治小兒甚著于時故季忠集其舊法以爲此書上卷論證中卷爲醫案下卷爲方陳振孫書錄解題馬端臨文獻通考並著錄明以來舊本久佚惟雜見諸家醫書中今從永樂大典內掇拾排纂得論證四十七條醫案二十三條方一百一十有四各以類編仍爲三卷又得閻季忠序一篇劉跂所作錢仲陽傳一篇並冠簡端條理秩然幾還其舊疑當時全部收入故無大佚脫也小兒經方于古罕見自乙始別爲專門而其書亦爲幼科之鼻祖後人得其緒論往往有回生之功如六味丸方本後漢張機金匱要略所載崔氏八味丸方乙以爲小兒純陽無煩益火除去肉桂附子二味以爲幼科補劑明薛己承用其方遂爲直補眞陰之聖藥

其斟酌通變動契精微亦可以槩見矣閻季忠永樂大典作閻孝忠然書錄解題及通考皆作季忠疑永樂大典爲傳寫之訛今改從諸家作季劉跂字斯立東平人摯之子也有學易集別著錄所撰乙傳與宋史方技傳略同蓋宋史卽據此傳爲藍本云乾隆四十五年十一月恭校上

總纂官內閣學士臣紀昀

光祿寺卿臣陸錫熊

纂修官翰林院編修臣王嘉曾

小兒藥證眞訣卷一

宋 錢乙撰

變蒸論

小兒在母腹中。乃生骨氣五臟六腑。成而未具全。自生之後。卽長骨脈。五臟六腑之神。肇也。變者易也。又生變蒸者。自內而長。自下而上。又身熱。故以生之日後三十二日一變。變每畢。卽情性存焉。[illegible]生腑臟智意故也。何謂三十二日長骨添精神。人有三百六十五骨。除手足中四十五[illegible]外。有三百二十數。自生下骨一日十段。而上之。十日百段。三十二日。計三百二十段。爲一遍。亦曰一蒸。骨之餘氣。自腦分入齦中。作三十二齒。而齒牙有不及三十二數者。由變不足。其常也。或二十八日卽至長二十八齒。已下倣此。但不過三十二之數也。凡一周變。乃發虛熱諸病。如是十周。則小蒸畢也。計三百二十日。生骨氣乃全。而未壯也。故初三十二日一變。生腎志。六十四日再變。生膀胱。其發耳與骭冷。腎與膀胱俱生于水。水數一。故先變生。九十六日三變。生心喜。一百二十八日四變生小腸。其發出汗而微驚。心爲火。火數一百六十日五變生肝哭。一百九十二日六變生膽。其發目不閉而赤。肝生木。木數三。二百二十四日七變生肺聲。二百五十六日八變生大腸。其發膚熱或汗或不汗。肺者金。金數四。二百八十八日九變生脾智。三百二十日十變生胃。其發不食腸痛而吐乳。此後乃齒生。能言知喜怒。故云始全也。大倉云氣入四

肢長碎骨于十變後六十四日長其經脈手足手受血故能持物足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可別治是以小兒須變蒸蛻齒者如花之易苗所謂不及三十二齒由變之不及齒當與變日相合也年壯而蛻齒方周

脈法論

脈亂不治氣不和弦急傷食沈緩虛驚急促風浮冷沈細

驚癇發搐論

驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證早辰發搐因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口內生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也補腎地黃丸治肝瀉青丸主之

日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸主之

日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散主之

夜間發搐因潮熱亥子丑時不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省一本云不納津液當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸主之

傷風後發搐。傷風後得之。口中氣出熱。呵欠頓悶。手足動搖。當發散。大青膏主之。小兒生本怯者。多此病也。

傷食後發搐。傷食後得之。身體温。多吐多睡。或吐不思飲食而發搐。當先定搐。搐過。白餅子下之。後服安神丸。百日內發搐。眞者不過三兩次必死。假者發頻不爲重。眞者內生驚癇。假者外傷風冷。蓋血氣未實。不能勝任。乃發搐也。欲知假者。口中氣出熱也。治之可發散。大青膏主之。及用塗顖浴體法。（塗顖浴體法此三卷內不載）

雜病證。赤兼青者。欲發搐。目直而青。身反折強直。生驚。咬牙甚者發驚。

急驚。因聞大聲。或大驚而發搐。發過則如故。此無除也。當下利驚丸主之。（利驚丸下卷只有涼驚丸無利或涼字之誤）小兒急驚者。本因熱生于心。身熱面赤。引飲。口中氣熱。大小便黃赤。劇則搐也。蓋熱甚則風生。風屬肝。此陽盛陰虛也。故利驚丸主之。以除其痰熱。不可與巴豆及温藥大下之。恐蓄虛熱不消也。小兒熱痰客于心胃。因聞聲非常。則動而驚搐矣。若熱極。雖不因聞聲及驚。亦自發搐。

五癇論

凡治五癇。皆隨臟治之。每臟各有一獸。並五色。凡犬癇。反折。上竄。犬叫。肝也。羊癇。目瞪。吐舌。羊叫。心也。牛癇。目直視。腹滿。牛叫。脾也。雞癇。驚跳。反折。手縱。雞叫。肺也。豬癇。如尸。吐沫。豬叫。腎也。五癇重者死。病後甚者亦死。

慢驚論

慢驚因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡睡露睛此無陽也薑蠍湯主之

急慢驚論

凡急慢驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合温補世間俗方多不分別誤小兒甚多凡小兒傷于風冷病吐瀉醫謂脾虛以温補之不已復以涼藥治之又不能已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣卽虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身温風在脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則利止宜風散主之後用使君子丸補其胃亦有諸吐痢久不差者脾虛生風而成慢驚

心論

見冬火旺心強勝腎當補腎治心輕者病退重者下竄不語腎怯虛也

五臟所主心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則困臥悸動不安心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水心熱視其睡口中氣温或合面睡欠上竄咬牙皆心熱也導赤散主之心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥心氣實則氣上下行澀合臥則氣不得通故喜仰臥則氣得上下通也瀉心湯主之（張潔古氏補遺溫中丸亦妙）

肝論

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則咬牙多欠氣熱則外生氣温則內生

肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之
肝有熱目直視不搐得心熱則搐肝有風目連劄不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散主之
肝外生感風呵欠頓悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當大黃丸微下之飲不可下
肝有風甚身反張強直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸主之
凡病或新或久皆引肝風風動而上于頭目目屬肝風入于目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也若熱入于目牽其筋脈兩眦緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青丸治心導赤散主之
肝病秋見肝強勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青丸主之

脾胃論

脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風脾病困睡洩瀉不思飲食
脾病見四旁皆做此治之順者易治逆者難治脾怯當面目赤黃五臟相反隨證治之
胃氣不和面皖白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之胃冷虛面皖白色瘦弱腹痛不思食當補脾益黃散主之下痢者調中丸主之氣不和口頻撮當調氣益黃散主之食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

虛羸。脾胃不和。不能食乳。致肌瘦。亦因大病。或吐瀉後。脾胃尙弱。不能傳化穀氣也。有冷者。時時下痢。脣口靑白。有熱者。溫壯。身熱。肌肉微黃。此冷熱虛羸也。冷者。木香丸主之。夏月不可服。如有證。則少服之。熱者。胡黃連丸主之。冬月不可服。如有證。則少服之。吐沫及痰。或白綠水。皆胃虛冷。

肺論

肺主喘實。則悶亂。喘促。有飮水者。有不飮水者。虛。則哽氣。長出氣。肺病。悶亂。哽氣。長出氣。氣短喘。肺熱。手搐眉目鼻面甘桔湯主之。肺虛熱。脣深紅色。治之散肺虛熱。少服瀉白散。吐稠涎及血。皆肺熱。久則虛。

肺癆。復有冷風。胸滿短氣。氣急。喘嗽上氣。當先散肺。後發散風冷。散肺。瀉白散。大靑膏主之。肺臟怯。脣白色。當補肺。阿膠散主之。若悶亂。氣奩。喘促。哽氣者。難治。肺虛損故也。脾肺病久則虛而脣白。脾者肺之母也。母子皆虛。不能相營。故名曰怯。肺主脣白。白而澤者吉。白如枯骨者死。肺病見春。金旺。肺勝肝。當瀉肺。輕者肺病退。重者目淡靑。必發驚。更有赤者。當搐。爲肝怯。當目淡靑色也。肺病勝肝。當補腎肝。治肺臟肝怯者。受病也。補肝腎。地黃丸治肺瀉白散主之。

腎論

腎主虛。無實也。惟瘡疹。腎實。則黑陷。腎病。無精光。畏明。體骨重。腎病見夏。水勝火。腎勝心也。當治腎。輕者病退。重者悸動。當搐也。

腎虛兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱即解也開面色皎白此皆難養縱長若恣色慾尋即亡也

或有因病而致腎虛者非也腎氣不足則下竅蓋骨重惟欲墜下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃丸主之

腎怯失音相似病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能進藥此非失音爲腎怯不能上接于陽故也當補腎地黃丸主之失音乃猝病耳

別虛實證論

假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

凡病先虛或下之合下者先實其母然後下之假令肺虛而痰實此可下先當益脾後方瀉肺也

五臟相勝輕重肝臟病見秋木旺肝強勝肺也宜補肺瀉肝輕者肝病退重者脣白而死

呵欠面赤者風熱呵欠面青者驚風呵欠面黃者脾虛驚呵欠多睡者內熱呵欠氣熱者傷風血氣怯爲冷所乘則脣青尿深黃色久則尿血小便不通久則脹滿當利小便洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛口噤不止則失音遲聲亦同

諸疳論

諸疳。疳在內。目腫。腹脹。痢色無常。或沫青白。漸瘦弱。此冷證也。疳在外。鼻下赤爛。自搔鼻頭上瘡。不著痂。漸遠耳生瘡。治鼻瘡爛。蘭香散。諸瘡。白粉散主之。

肝疳。白膜遮睛。當補肝。地黃丸主之。心疳。面黃頰赤。身壯熱。當補心。安神丸主之。脾疳。體黃。腹大。食泥土。當補脾。益黃散主之。腎疳。極瘦。身有瘡疥。當補腎。地黃丸主之。筋疳。瀉血而瘦。當補肝。地黃丸主之。肺疳。氣喘。口鼻生瘡。當補脾肺。益黃散主之。骨疳。喜臥冷地。當補腎。地黃丸主之。

諸疳。皆依本臟補其母。及與治疳藥。冷則木香丸。熱則胡黃連丸主之。疳。皆脾胃病。亡津液之所作也。因大病或吐瀉後。以藥吐下。致脾胃虛弱。亡津液。且小兒病疳。皆愚醫之所壞。假如潮熱。是脾臟虛。一臟實而內發虛熱也。法當補母而瀉本臟則愈。假令日中發潮熱。是心虛熱也。肝爲心母。則宜先補肝。肝實而後瀉心。心得母氣。則內平而潮熱愈也。醫見潮熱。妄謂其實。乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之。利既多矣。不能禁約。而津液內亡。卽成疳也。又有病癖。其發作寒熱。飲水。脅下有形硬痛。治癖之法。當漸消磨。醫反以巴荳硼砂輩下之。小兒易虛易實。下之既過。胃中津液耗損。漸令疳瘦。又有病傷寒五六日間有下證。以冷藥下之太過。致脾胃津液少。既使引飲不止。而生熱也。熱氣內耗。肌肉外消。他邪相干。證變諸端。因亦成疳。又有吐瀉久病。或醫妄下之。其虛益甚。津液燥損。亦能成疳。又有肥疳。卽脾疳也。身瘦黃皮乾。而有瘡疥。其候不一。種種異端。今略舉綱紀。目澀。或生白膜。脣赤。身黃乾。或黑。喜臥冷地。或食泥土。身有瘡疥。瀉青白黃沫水。痢色變易。腹滿。身耳鼻皆有瘡。髮鬢作穗。頭大項細。極瘦。飲水。皆其證也。大抵疳病當辨

冷熱肥瘦。其初病者爲肥熱疳。久病者爲瘦冷疳。冷者木香丸。熱者黃連丸主之。冷熱之疳。尤宜如聖丸。故小兒之臟腑柔弱。不可痛擊大下。必亡津液而成疳。凡有可下量其大小虛實而下之。則不至爲疳也。初病津液少者。當生胃之津液。白朮散主之。唯多則妙。

腹中有癖不食論

腹中有癖不食。但飲乳是也。當漸用白餅子下之。小兒病癖。由乳食不消。伏在腹中。乍涼乍熱。或水或喘嗽。與潮熱相類。不早治。必成疳。以其有癖。則令兒不食。致脾胃虛而發熱。故或水過多。卽瀉滌脾胃。亡失津液。脾胃不能傳化水穀。其脈沈細。益不食。脾胃虛衰。四肢不舉。諸邪遂生。羸瘦而成疳矣。餘見疳門。

腹脹論

虛實腹脹。腹脹由脾胃虛。氣攻作也。實者。悶亂喘滿。可下之。用紫霜丸。白餅子。不喘者虛也。不可下。若誤下。致脾虛。氣上附而行。肺與脾子母皆虛。肺主目胞腮之類。脾主四肢。母氣虛甚。卽目胞腮腫也。色黃者。屬脾也。治之用塌氣丸漸消之。未愈。漸加丸數。不可以丁香、木香、橘皮、荳蔻、大溫散藥治之。何以然。脾虛、氣未出。腹脹而不喘。可以散藥治之。使上下分消其氣。則愈也。若虛氣已出。附肺而行。卽脾胃內弱。每生虛氣。入于四肢面目矣。小兒易爲虛實。脾虛不受寒溫。服寒則生冷。服溫則生熱。當識此。勿誤也。胃久虛熱。多生疳病。或引飲不止。脾虛不能勝腎。隨肺之氣上行于四肢。若水狀。腎氣浸浮于肺。卽大喘也。此當服塌氣丸。病愈後。面未紅者。虛衰未復故也。治腹脹者。譬如行兵。戰寇于林。寇未出林。以兵攻之。必可獲

寇若出林不可急攻攻必有失當以意漸收之卽順也
治虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便黃時微喘脈伏而實時飮水能食者可下之蓋脾初虛而後結有積所治宜先補脾後下之下後又補脾卽愈也補肺恐生虛喘

黃疸論

黃柑似身皮目皆黃者黃病也身痛體背強大小便澀一身皆黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴者難治此黃疸也二證多病于大病後別有一證生下百日及半年不因病後身微黃者胃熱大人亦同又有面黃腹大食土渴者脾疸也又有自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯胃不和也

傷風論

傷風貪睡口中氣熱呵欠頓悶當發散與大靑膏解不散有下證當下大黃丸主之大飮水不止而善食者可微下餘不可下也
傷風手足冷脾臟怯也當和脾後發散和解益黃散發散大靑膏主之
傷風自痢脾臟虛怯也當補脾益黃散發散大靑膏主之未差調中丸主之有下證大黃丸主之後服溫驚丸
傷風腹脹脾臟虛也當補脾必不喘後發散仍補脾也去脹塌氣丸主之發散大靑膏主之

傷風兼臟。兼心則驚悸。兼肺則悶亂喘急。哽氣長出氣。嗽。兼腎則畏明。各隨補母。臟虛見。故也。

傷風下後餘熱。以藥下之太過。胃中虛熱。飲水無力也。當生胃中津液。多服白朮散。

傷風吐瀉論

傷風吐瀉。身温。乍涼乍熱。睡多、氣麤、大便黃白色。嘔吐。乳食不消。時欬嗽。更有五臟兼見證。當煎入臟君臣藥。先服大青膏。後服益黃散。如先曾下。或無下證。愼不可下也。此乃脾肺受寒。不能入食也。

傷風吐瀉。身熱、多睡、能食乳。飲水不止、吐痰、大便黃水。此爲胃虛熱渴吐瀉也。當生胃中津液。以止其渴。止後用發散藥。止渴。多服白朮散。發散。大青膏主之。

傷風吐瀉。身涼、吐沫、瀉青白色。悶亂不渴。哽氣長出氣。睡露睛。此傷風在苒輕怯。因成吐瀉。當補脾。後發散。補脾、益黃散。發散。大青膏主之。此二證多病于春秋也。

夏秋吐瀉。五月夏至以後。吐瀉。身壯熱。此熱也。小兒臟腑十分中九分熱也。或因傷熱。乳食吐瀉不消。瀉深黃色。玉露散主之。

六月大暑以後吐瀉。身温似熱。臟腑六分熱。四分冷也。吐嘔乳食不消。瀉黃白色。似瀉。或食乳。或不食乳。食前少服益黃散。食後多服玉露散。

七月立秋以後。吐瀉。身温涼。三分熱。七分冷也。不能食乳。多似睡悶亂。哽氣長出氣。睡露睛。脣白。多噦。欲大便。不渴。食前多服益黃散。食後少服玉露散。

八月秋分以後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐水當補脾益黃散主之不可下也

嘔吐論

吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱吐瀉乳不化傷食也下之瀉黃紅赤黑皆熱赤亦毒瀉青白穀不化胃冷

初生吐不止論

凡小兒初生下拭掠兒口中穢惡不盡嚥入喉中故吐木瓜丸主之凡初生急須拭掠口中令淨若啼聲一發則嚥下多生諸病

初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白色是傷食當下之後和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

初生三日以上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有兼見證肺睡露睛喘氣心驚悸飲水脾困倦饒睡肝呵欠頓悶腎不語畏明當瀉見兒兼臟補脾益黃散主之此二證多病于秋夏也

吐痰涎論

凡吐痰涎熱者下之冷者溫之

咳嗽論

夫咳者肺感微寒。八九月間。肺氣大旺。病嗽者。其病必實。非久病也。其證面赤、痰盛、身熱。法當以葶藶丸下之。若久者不可下也。十一月十二月嗽者。乃傷風也。風從背脊第三椎肺俞穴入也。當以麻黃湯汗之。有熱證。面赤。飲水、涎熱。咽喉不利者。宜兼甘桔湯治之。若五七日間。其證身熱。痰盛唾黏者。以褊銀丸下之。有肺盛者。咳而後喘。面腫。欲飲水。有不飲水者。其身即熱。以瀉白散瀉之。若傷風咳嗽五七日。無熱證而但嗽者。亦葶藶丸主之。後用化痰藥。有肺虛者。咳而哽氣。時時長出氣。喉中有聲。此久病也。以阿膠散補之。痰盛者。先實脾。後以褊銀丸微下之。涎退即補肺。如上法。有嗽而吐水。或青綠水者。以百祥丸下之。有嗽而吐痰涎乳食者。以白餅子下之。有嗽而咯膿血者。乃肺熱。食後服甘桔湯。久嗽者肺亡津液。阿膠散補之。咳而痰實。不甚喘。面赤。時飲水者。可褊銀丸下之。治嗽大法。盛即下之。久即補之。更量虛實。以意增損。

風温潮熱相似論

風温潮熱。壯熱相似。潮熱者。時間發熱。過時即退。來日依時發熱。此欲發驚也。壯熱者。一向熱而不已。甚則發驚癇也。風熱者。身熱而口中氣熱。有風證。温壯者但温而不熱也。治小兒壯熱昏睡、傷風風熱、瘡疹傷食。皆相似。未能辨認。間服升麻葛根湯。惺惺散。小柴胡湯。甚驗。蓋此四藥通治之。不致誤也。惟傷食則大便酸臭。不消化。畏食或吐食。宜以藥下之。

諸汗論

喜汗厚衣臥而額汗出也．止汗散主之．

盜汗睡而自汗出肌肉虛也．止汗散主之．遍身汗．香瓜丸主之．

六陽虛、汗上至頭．下至項．不過腦也．不須治之．

胃怯汗．上至頂．下至臍．此胃虛．當補胃．益黃散主之．

熱渴論

或洩瀉等諸病．煩渴者．皆津液內耗也．不問陰陽．宜煎白朮散．使滿意取足飲之．彌多彌好．

身熱論

身熱不飲水者．熱在外．身熱飲水者．熱在內．

熱證疎利或解化後．無虛證．勿溫補．熱必隨生．

積痛論

積痛．口中氣溫．面黃白．目無精光．或白睛多．及多睡．畏食．或大便酸臭者．當磨積．宜消積丸．（按下卷有消積丸．無消積丸．）甚者．當用白餅子下之．後和胃．胃白朮散．

心痛論

心痛不吐水者冷．心痛吐水．不心痛者．胃冷病．心痛吐水者蟲病．

蟲痛論 虛實痛附

面皎白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安蟲散主之小兒本怯者多此病積痛食痛虛痛大同小異惟蟲痛者當口淡而沫自出治之隨其證用藥口中吐沫水者後必蟲痛蟲與癎相似小兒本怯故胃虛冷則蟲動而心痛與癎略相似但目不斜手不搐也安蟲散主之

胎熱論

胎熱生下有血氣時叫哭身壯熱如漬茶色目赤小便赤黃糞稠急食乳浴體法主之更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

胎熱面紅目黑睛多者喜笑

胎肥論

胎肥生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸肌瘦目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎浴體法主之

胎怯論

胎怯面黃目黑睛少白睛多者多哭

胎怯生下面色無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精采當浴體法主之

夜啼論

夜啼脾臟冷兒痛也當以温中藥及以法禳之花火膏主之

驚啼論

驚啼邪熱乘心也安心定神丸主之（下卷有安神丸無安心定神丸）

食乳論

大喜後食乳食多成驚哭後食乳多成吐瀉

急欲乳不能食由客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚脣燥口不能乳當涼心脾

顱顖不合論

解顱生下而顖不合腎氣不成也長必少笑更有目白睛多眩白色瘦者多愁少喜也

龜胸論

龜胸肺熱脹滿攻于胸膈即成龜胸又乳母多食五辛亦成也

龜背論

兒生下客風入脊逐于骨髓即成龜背治之以龜尿點骨上取尿之法當蓮葉安龜在上後用鏡照之自尿出以物盛之

行遲論

長大不行行則脚細（此下有脫文）

弄舌舒舌論

弄舌。脾臟微熱。令舌絡微緊。時時舒舌。治之勿用冷藥及下之。當少與瀉黃散服之。亦或飲水。醫疑爲熱。必冷藥下之。非也。飲水者。脾胃虛。津液少也。又加面黃肌瘦。五心煩熱。卽爲疳瘦。宜加胡黃連丸。輩大病未已。用藥弄舌者凶。

齒落不生論

齒落不生。齒生不固。（缺此下有脫文。）

目論

目內證。赤者。心熱。導赤散主之。淡紅者。心虛熱。生犀散主之。青者。肝熱。瀉青丸主之。淺淡者。補之。黃者。脾熱。瀉黃散主之。無精光者。腎虛。地黃丸主之。

傷寒瘡疹同異論

論傷寒瘡疹同異云。傷寒。男體重面黃。女面赤喘急。憎寒。及口中氣熱。呵欠煩悶。項急也。瘡疹。則腮赤燥。多噴嚏。悸動昏倦。叫肢冷。傷寒當發散。瘡疹當溫平。有大熱者。解毒。（海藏云。發散者。神朮湯之類。溫平者。非熱劑。如荊芥薄荷防風牛蒡甘草之類。活人風黏子湯是也。與翟古老人解毒防風湯相兼選用。解毒者。三黃湯金花丸之類。）

瘡疹候論

面燥。腮赤。目疱亦赤。呵欠煩悶。乍涼乍熱。咳嗽噴嚏。手足積冷。夜臥驚悸。多睡。並瘡疹證。此天行之病也。

惟用溫涼治之不可妄下及妄攻發此辛涼調之也海藏云肝藏水疱色或青肺臟膿疱色或白脾臟疹或如麩糠心臟斑其色赤歸腎變色黑此五色凡見于瘡或一色或三色相合而病或作次第大小不等九日之內三出之亦無定也惟斑疹病後發或痼餘瘡難發痼矣木勝脾木歸心故也若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸（圖下卷有小紅丸白粉丸無粉紅丸）小兒在胎十月食五臟血穢生下則其毒當出故瘡疹之狀皆五臟之液肝主淚肺主涕心主血脾爲裏血其瘡出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青小肺爲膿疱以涕稠濁色白而大心爲斑主心血色赤而小次于水疱脾爲疹小次斑瘡其主裏血故色赤黃淺也涕淚出多故膿疱水疱皆大血榮于內所出不多故斑疹皆小也病疱者淚涕俱少譬如疱中容水水去則瘦故也

始發潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多者熱留膚腠之間故也潮熱隨臟出如早食潮熱不已爲水疱之類也

瘡疹始出之時五臟證見惟腎無候但見平證耳尻涼耳涼是也尻耳俱屬于腎其居北方主冷也若瘡黑陷而耳尻反熱者爲逆若用百祥丸牛李膏三服不愈者死病也

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出不止煩燥熱温腹脹啼喘大小便不通者困也

凡瘡疹當乳母愼口不可令飢及當風冷必歸腎而變黑難治也海藏云或熱極反兼水化者亦能變黑當以涼藥主之不可不察以脈別之可

也.或有出色正者.內素有熱.頭反陷.色或青灰.似黑.中有針眼.下陷.當急以凉藥疎之.便結者.大黃牽牛之類.便軟者.金花丸之類.更有大熱者.當利小便.有小熱者.宜解毒.若黑紫乾陷者.百祥丸下之.不黑者.愼勿下.更有時月輕重.大抵瘡疹屬陽.出則爲順.故春夏病爲順.秋冬病爲逆.冬月腎旺.又盛寒.病多歸腎.變黑.又當辨春膿疱.夏黑陷.秋斑子.冬疹子.亦不順也.重者十治四五.黑者無問何時.十難救其一二.其候或寒戰噤牙.或身黃腫.紫宜以百祥丸下之.復惡寒不已.身冷出汗.耳尻反熱者.死病也.何以然.腎氣大旺.脾虛不能治故也.下後.身熱氣溫.欲飮水者.可治.以脾主勝腎.寒去而溫熱也.治之當解毒.不可妄下.妄下則內虛.多歸于腎.若能食而痂頭焦起.或未焦而喘實者.可下之.身熱煩渴.腹滿而喘.大小便澀.面赤悶亂.大吐者.當利小便.不差者.宜風散下之.若五七日痂不焦.是內發熱.熱氣蒸于皮膚中.故瘡不得焦痂也.宜宣風散導之.用生犀磨汁解之.使熱不生.必著痂矣.

瘡疹由內相勝也.惟斑疹能作搪.疹爲脾所生.脾虛而肝旺乘之.木來勝土.熱氣相擊.動于心神.心喜爲熱.神氣不安.因搪成癇.斑子爲心所生.心生熱.熱則生風.風屬于肝.二臟相搏.風火相爭.故發搪也.治之當瀉心肝.補其母.栝蔞根湯主之.

瘡黑而忽瀉.便膿血.幷痂皮者順.水穀不消者逆.何以然.且瘡黑屬腎.脾氣本強.或舊服補脾藥.脾氣得實.腎雖用事.脾可制之.今瘡入腹爲膿血.及連痂皮得出.是脾強腎退.卽病出而安也.米穀反瀉.乳不化者.是脾虛不能制腎.自洩也.此必難治.海藏云.瀉出痂皮.根在內也.表裏俱病.是爲大疾.水穀化者順.水穀不化者逆也.鄭端友辨證.錢氏薩拉.錢氏論瘡疸證.惟用溫涼

藥。不可妄吐下。及攻發。又云寒顫嚙牙。身黃紫腫。急以百祥丸下之。又身熱煩渴腹滿而喘。大小便澀。面赤悶亂。吐。當利小便。不差。宜風散下之。此皆瘡痘盛出之證。先發膿疱。後發水疱。多者順。少者逆。先水疱。後斑子。多者逆。少者順。先疹子。後斑子者順。凡瘡疹只出一般者善。海藏云。此一句足以知雜出者。諸藏相合而不齊也。用藥亦難矣。雜證又云。先發膿疱。後發斑子者逆。先發膿疱。後發疹子者順。先發水疱。後發疹子者。逆。海藏云。前後例。五色各隨五藏。亦有二色相合。或有三色。即無定也。與此前後膿。水。斑。疹。大小不同。先後順逆。大意相若。

瘡疥風癬論

夫小兒瘡疥風癬。可用雄黃散。加芒硝少許。油調傅之。如面上有瘡癬。不宜搽藥。恐因而入眼。則損目必矣。

不治證論

目赤脈貫瞳人。　腦腫及陷。　鼻乾黑。　魚口氣急。　吐蟲不定。　瀉不定。　精神好。　大渴不定。止之又渴。　吹鼻不嚏。　病重。口乾不睡。　時氣脣上靑黑點。　頰深赤。如塗臙脂。　鼻開張。喘急不定。

小兒藥證眞訣卷二

搐別眞假

李司戶孫病生百日。發搐三五次。請衆醫治。或作天弔。或作胎驚。或作驚癎。皆無應者。後錢氏用大靑膏。如小豆許。作一服發之。復與塗顖法封之。及浴法三日而愈。何以然。嬰兒初生。肌骨嫩怯。被風傷之。子不能任。故發搐。頻發者輕。何者客風在內。每遇不任。卽搐。搐稀者是內臟發病。不可救也。頻搐者宜散風冷。故用大靑膏。但不可多。兒至小易虛易實。多卽生熱。止一服而已。更當封浴。無不效者。

發搐順逆

李寺丞子三歲。病搐。自卯至巳。數醫不治。召錢氏視之。搐目右視。大叫哭。李曰。何以搐右。錢曰。逆也。李曰。何以逆。曰。男爲陽而本發左。女爲陰而本發右。若男發搐時。目左視無聲。右視有聲。女發搐時。右視無聲。左視有聲。所以然者。左肝右肺。肝木肺金。男目右視。肺勝肝也。金來刑木。二臟相戰。故有聲也。治之。瀉其強而補其弱。心實者亦當瀉之。肺虛不可瀉。肺虛之候。悶亂。哽氣長出氣。此病男反女。故男易治。于女也。假令女發搐目左視。肺之勝肝。又病在秋。卽肺兼旺位。肝不爲任。故叫哭。當大瀉其肺。然後治心續肝。所以俱言目反右視者。乃肝主目也。凡搐者。風熱相搏于內。風屬肝。故引見之于目也。錢用瀉肺湯瀉之。二日不悶亂。當知肺病退。後用地黃丸補腎。三服後。用瀉靑丸。涼驚丸。各二服。凡用瀉心肝藥五日方愈。不

妄治也。又言肺虛不大瀉者何也。曰設令男目右視。木反尅金。肝旺勝肺。而但瀉肝。若更病在春夏。金氣極虛。故當補其肺。愼勿瀉也。

潮熱問難

皇都徐氏子。三歲。病潮熱。每日西則發搐。身微熱。而目微斜。及露睛。四肢冷。而喘。大便微黃。錢與李醫同治。錢問李曰。病何搐。李曰有風。何身熱微溫。曰四肢所作。何目斜睛露。曰搐則目斜。何肢冷。曰冷必內熱。曰何喘。曰搐之甚也。曰何以治之。曰凡鼻中灌之必搐止。錢又問曰。既謂風病溫壯。搐引目斜露睛。內熱肢冷。及搐甚而喘。併以何藥治之。李曰皆此藥也。錢曰不然。搐者肝實也。故令搐。日西而身微熱者。肺潮熱用事。肺主身溫。且熱者爲肺虛。所以目微斜露睛者。肝肺相勝也。肢冷者脾虛也。肺若虛甚。母脾亦弱。木氣乘脾。四肢卽冷。治之當先用益黃散。阿膠散。得脾虛證退後。以瀉青丸。導赤散。涼驚丸。治之九日愈。

吐瀉爭功

廣親北宅。四大王宮。五太尉。病吐瀉不止。米穀不化。衆醫用補藥。言用薑汁調服之。六月中服溫藥。一日而加喘吐不定。錢曰當以涼藥治之。所以然者。謂傷熱在內也。用石膏湯三服併服之。衆醫皆言吐瀉多而米穀又不化。當補脾。何以用涼藥。王信衆醫。又用補脾散。丁香散。三服。錢後至。曰不可服此。三日外必腹滿身熱。飲水吐逆。三日外一如所言。所以然者。謂六月熱甚。伏入腹中。而令引飲。熱傷脾胃。卽大吐瀉。他醫又行溫藥。卽上焦亦熱。故喘而引飲。三日當死。衆醫不能治。復召錢至宮中。見有熱證。以白虎湯三

服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服四日用石膏湯一服旋新合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂爲衣與五丸竹葉湯化下熱退而安

吐瀉問難

廣親宮七太尉七歲病吐瀉是時七月其證全不食而昏睡睡覺悶亂哽氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與使君子丸補脾退熱石膏湯次日以水銀硫黃二物末之生薑水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下而一分補八月內十分補而一分下此是脾虛瀉醫妄治之至于虛損下之卽死當只補脾若以使君子丸卽緩錢又留溫胃益脾藥止之醫者李生曰何食而噦錢曰脾虛不能食津少卽嘔逆何瀉青水曰腸胃至虛冷極故也錢治而愈

虛實下藥

馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢氏乃曰目中黑睛少白睛多面色㿠白此子必多病面色㿠白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱酒慾慾若不保養不過壯年面上常無精神光澤如婦人之失血也今吐痢不食壯熱者傷食也不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛此但以消積丸磨之爲微有食也如傷食甚則可下不下則成癖也實食在內乃可下之下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

寒熱相反

京東轉運使李公孫八歲病嗽而胸滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘錢氏曰此肺氣不足復有寒邪卽使喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治心藥也醫有慙色錢治愈

補下不同

段齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯及防已丸治之不愈其痰上攻吐喘不止請錢氏下褊銀丸一大服復以補肺散補脾散治之今段氏咯血肺虛何以下之曰肺雖咯血有熱故也久卽虛痿令涎上潮而吐當下其涎若使不吐涎爲其便也蓋吐涎能虛又生驚也痰實上攻亦使發搐故依法只宜下痰後補脾肺必涎上而吐愈若先補其肺爲逆先下其痰爲順先下後補爲良也

癖爲潮熱

曹宣德子三歲面黃時發寒熱不欲食而飮水及乳不止衆醫以爲潮熱用牛黃丸麝香丸不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢氏曰當下白餅子主之後補脾乃以消積丸磨之此癖也後果愈何以故不食但飮水者食伏脘內不能消致令發寒服止渴藥吐者藥衝脾故也下之卽愈

虛實熱證

朱監簿子五歲忽發熱醫曰此心熱也腮赤而脣紅煩躁引飮遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之來

日不愈。反加無力。而不能食。又下之。便痢黃沫。錢曰。心驚虛。而有留熱在內。必被涼藥下之。致此虛勞之病也。錢先用白朮散。生胃中津。後以生犀散治之。朱曰。大便黃沫如何。曰胃氣正。卽瀉自止。此虛熱也。朱曰。醫用瀉心湯如何。錢曰。瀉心湯者。黃連一物耳。黃連性寒。多服則痢。內傷脾胃也。坐久。衆醫至。曰。實熱。錢曰。虛熱。若實熱。何以瀉心湯下之不安。又加面黃頰赤。五心煩躁。不食而引飲。醫曰。既虛熱。何大便黃沫。錢笑曰。黃沫。服瀉心湯多。故也。錢後與胡黃連丸治之。愈。

熱不可下

朱監簿子。五歲。夜發熱。曉卽如故。衆醫有作傷寒者。有作熱者。以涼藥解之。不愈。其候多涎而喜睡。他醫以牛黃圓下涎。其病益甚。至五日。大引飲。錢氏曰。不可下之。乃取白朮散。未一兩。煎藥汁三升。使任其意取足服。朱曰。飲多。不作瀉否。錢曰。無生水不能作瀉。縱瀉。不足怪也。但不可下耳。朱曰。先治何病。錢曰。止瀉。治痰。退熱。清神。其藥至晚服盡。錢氏曰。更可服三升。又煎白朮散三升。服盡。得稍減。三日。又服白朮散三升。其子不渴。無涎。又投阿膠散二服而安。

預說驚疾

廣親宅七太尉方七歲。潮熱數日。欲愈。錢謂其父二大王曰。七使潮熱將安。八使預防驚搐。王怒曰。但使七使愈。勿言八使病。錢曰。八使過來日午間。卽吾苦也。次日午前果作急搐。召錢治之。三日而愈。蓋預見目直視而顫。赤。必肝心俱熱。更坐石杌子。乃欲冷。此熱甚也。肌膚素肥盛。脈又急促。故必驚搐。所言午時

者。自寅至午皆心肝所用事時。治之瀉心肝。補腎自安矣。

溫冷用藥

東都張氏孫。九歲。病肺熱。他醫以珠犀。龍腦。生牛黃。治之一月不愈。其證。嗽喘悶亂。飲水不止。食不能入。錢氏用使君子丸。益黃散。張曰。本有熱。何以又行溫藥。他醫用涼藥攻之一月。尙無效。錢曰。涼藥久則胃寒不能食。小兒虛不能食。當補脾。候飲食如故。卽瀉肺經。病愈矣。服補脾藥二日。其子欲飲食。錢以瀉白散瀉肺。遂愈七分。張曰何以不虛。錢曰先實其脾。然後瀉肺。故不虛也。

陰癇壞病

東都王氏子。吐瀉。諸醫用藥下之。至虛。變慢驚。其候睡露睛。手足瘈瘲而身冷。錢曰此慢驚也。與薤蘞湯。其子胃氣實。卽開目而身溫。王疑其子不大小便。令諸醫以藥利之。醫留八正散等。數服不利。而身復冷。令錢氏利之。錢曰不當利。利之必身冷。王曰已身冷矣。因抱出。錢曰不能食而胃中虛。若利大小便卽死。久卽脾腎俱虛。當身冷而閉目。幸胎氣實而難衰也。錢用益黃散。使君子丸。四服。令微飲。至日午。果能飲食。所以然者。謂利大小便。脾胃虛寒。當補脾不可攻也。後又不語。諸醫作失音治之。錢曰既失音。何開目而能飲食。又牙不噤而口不緊也。諸醫不能瞻。錢以地黃丸補腎。所以然者。用涼藥利小便。致脾腎俱虛。今脾已實。腎尙虛。故補腎必安。治之半月而能言。一月而痊也。

治病有等

張氏三子病大者汗遍身次者上至頂下至胸小者但額有汗衆醫以麥煎散治之不愈錢氏曰大者與香瓜丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈

用藥識證

鄭人齊郎中者家好收藥散施人其子忽臟熱齊自取青金膏三服併一服而餌之服畢至三更瀉五行其子困睡齊言睡多亦驚又與青金膏一服又瀉二行加口乾而身熱齊言尙有微熱未盡又與青金膏其妻曰用藥十餘行未安莫生病否召錢氏曰已成虛羸先多煎白朮散時時服之後用香瓜丸十三日愈

病誤用巫

王駙馬子五歲病目直視而不食或言有神祟所使請巫師祝神燒紙病不愈召錢至曰臟腑之疾何用求神錢與瀉肝丸愈

病篤訣

黃承務子二歲病瀉衆醫止轉十餘日其證便青白乳物不消身涼加哽氣昏睡醫謂病困篤錢氏先以益脾散三服補肺散三服三日身溫而不哽氣後以白餅子微下之又與益脾散三服痢止何以然痢本脾虛傷食初不與大下措置十日上實下虛脾氣弱引肺亦虛補脾肺病退卽身溫不哽氣是也有所傷食仍下之也何不先下後補曰便青爲下臟冷先下必大虛先實脾肺下之則不虛而後更補之也

嗽痛決死

東都藥鋪杜氏有子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒搐入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃蜚發散後用涼藥壓之卽愈時醫與鐵粉丸半夏丸褊銀丸諸法下之其肺卽虛而嗽甚至春三月間尙未愈召錢氏視之其候面靑而光嗽而喘促哽氣又時長出氣錢曰病困十已八九所以然者面靑而光肝氣旺也春三月肝位衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三月久卽虛痿又曾下之脾肺子母也復爲肝所勝此爲逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉靑丸散之後與阿膠散實肺次日面靑而不光錢又補肺而嗽如前錢又瀉肝瀉肝未已又加肺虛脣白如練錢曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得其時而肝勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛此不久生故言死也此證病于秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死

蟲痛決死

辛氏女年五歲病蟲痛諸醫以巴漆硇砂之屬治之不效至三日外多哭而仰臥自按心腹時大叫面色或靑或黃或白睛無光而慢脣白吐沫至五日胸高而臥不安錢詳而視之用蘇羌散三服見目不除靑色錢氏曰此病大困若更加瀉則爲逆至次日錢見辛曰夜來三更而瀉錢于瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有藥丸錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃冷則蟲動今反目靑此肝乘脾又脾加瀉知其氣極虛也而丸藥隨糞下卽脾胃已脫兼形病不相應故知死病七日而死

瘡疹標本

睦親宅十太尉病瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃熱何以午涼午熱若言母腹中有毒屬何臟也醫曰在脾胃錢氏曰既在脾胃何以驚悸（醫此句下脫醫曰云云）錢曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母穢液入兒五臟食至十月滿胃脘中至生之時口有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汁壓之方下臍糞及涎穢也此亦母之不潔餘氣入見臟中本先因微寒入而成瘡疹未出五臟皆見病證內一臟受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呵欠煩悶驚悸午涼午熱手足冷面腮赤燥咳嗽時嚏此五臟證具也呵欠煩悶肝也時發驚悸心也午涼午熱手足冷脾也面目腮頰赤嗽嚏肺也惟腎無候以在臍下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證則肝水疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食毒穢而無諸證瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又用抱龍丸數服愈以其別無他候故未發出則現五臟證已出則歸一臟也（海藏云本先因微寒入一句井中不慎風冷而不飽內虛一句忽認作寒證當識用抱龍丸即知瘡疹多熱也瘡疹未出五臟皆見內一臟受穢多者乃出此一句亦可以預知何臟以脈別之見知何臟或斑或疹其名可得）

瘡疹有慼

睦親宅一大王病瘡疹始用一李醫又召錢氏錢留抱龍丸三服李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若非轉下則爲逆病王曰李已用藥下之錢曰瘡疹未出未有他證不可下也但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也如瘡疹三月不出或出不快即微發之發之不出即加藥加藥不出即大發之如大發後不

出。及脈平無證者。卽瘡本稀。不可更發也。有大熱則當利小便。小熱當解毒。若出快。勿發勿下。故止用抱龍丸治之。瘡痂若起。能食者。大黃丸下之。瀉一二行卽止。今先下一日。瘡疹未能出盡。而稠密甚。則難治。此誤也。縱得安。其病有三。一者疥。二者癩。三者目赤。李不能治。經三日黑陷。復召錢氏。錢氏曰。幸不發寒而病未困也。遂用百祥丸爲藥。以牛李膏爲助。各一大服。至五日間。瘡復紅活。七日而愈。蓋黑者歸腎也。腎旺勝脾。土不尅水。因脾虛寒。戰則難治。所用百祥丸。春以瀉膀胱之腑。若不實臟。自不勝也。何以不瀉腎。曰。腎主虛不受瀉。故三服不效。卽加寒而死。

熱傳瘡疹

四大王宮五太尉。因墜鞦韆。發驚搐。醫以發熱藥治之。不愈。錢曰。本急驚後生大熱。當先退其熱。以大黃丸玉露散。惺惺丸。加以牛黃龍腦解之。不愈。至三日。肌膚尙熱。錢曰。更二日不愈。必發斑瘡。蓋熱不能出也。他醫初用藥發散入表。表熱而斑生。本初驚時。當用利驚藥下之。今發散。乃逆也。後二日果斑出。以必勝散治之。七日而愈。（鄭端友按。活人書。用無此散。治瘡疹惡候。出不快。及黑瘡子。內使朱砂腦麝牛黃輕粉水銀等數之。取下如一魚腸。推之。藥性極難用。）小兒耳冷。尻冷。手足乍煖乍涼。面赤。時嗽時嚏。驚悸。此瘡疹欲發也。未能辨認。間服升麻湯。消毒散。已發未發皆宜服。仍用胡荽酒。黃檗膏。暑月煩躁。食後與白虎湯。玉露散。熱盛與紫雪。咽喉或生瘡。與甘桔湯。甘露散。餘依錢說。大人同。小兒法。大槩與大人同。惟劑料小大不同耳。（海藏云。消毒散。太陽藥。白虎湯。治身熱目痛鼻乾。不得臥。陽明藥也。正爲泄時暑之劑。甘露飮子。肺腎藥也。甘桔湯。少陰藥也。紫雪。天門冬。麥門冬。黃芩。地黃。爲血劑。玉露散。肺腎藥。石膏寒水石爲氣劑。）

小兒藥證眞訣卷三

地黃丸

熟乾地黃（八錢焙秤） 山茱萸 乾山藥（各四錢） 澤瀉 牡丹皮 白茯苓（去皮各三錢）

右爲末煉蜜和丸如桐子大三歲以下一丸至三丸溫水空心化下

當歸散 凡小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青手冷不吮乳是也宜此方

當歸（去蘆頭切焙秤） 白芍藥 人參（各一分） 桔梗 陳橘皮（不去白各一錢） 甘草（炙半分作二分）

右爲細末水煎半盞時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃人參湯下

調中丸

白朮 人參 甘草（炒各半兩） 乾薑（炮四錢）

右爲細末蜜丸如菉豆大每服半丸至五七丸至二三十丸食前溫水送下

塌氣丸

胡椒（一兩） 蠍尾（去毒半兩）

右爲細末麪糊丸粟米大每服五七丸至二三十丸陳米飲下無時一方有木香一錢

大青膏

天麻末作一分一錢　白附子末生一錢半　蠍尾去毒生五分　青黛研一錢　硃砂研　天竺黃研　麝香研各一字七

烏稍蛇肉酒浸焙乾取末半錢

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲以上同甘露散服　閻氏集保生信效方內小兒諸方言皆得于汝人錢乙其間大青膏減天麻添大青生研一分其餘藥味分料和製與此皆同載證治云治小兒傷風其候伸欠頓悶口中氣熱惡風脈浮比此爲詳只用薄荷湯下今並見于此

敗毒散　治傷風時氣寒嗽嗽

人參去蘆　茯苓剉　甘草炙剉　前胡去苗洗　芎藭剉　羌活去苗洗　獨活去苗洗　桔梗剉　柴胡去苗洗　枳殼麩炒去瓤秤各半兩

右爲細末每服二錢水一盞入生薑薄荷少許同煎至七分去滓放溫量大小加減與之此古方也錢氏加甜葶藶半兩薄荷葉半兩名羌活散

玉露散一名甘露散

寒水石半兩軟而發青黑中有細紋者是　石膏半兩堅白而有稜手不可折者是如無以方解石代之堅白似石膏敲之段段皆方是也　甘草生一分

右同爲細末每服一字或半錢一錢食後溫湯調下海藏云非腎熱相火大盛不宜服此

異功散　温中和氣。治吐瀉不思食。凡治小兒虛冷病證。先與數服。以正其氣。

人參（切。去蘆。）　茯苓（去皮。）　白朮　甘草（炒。）　陳橘皮（各等分。）

右爲細末。每服二錢。水一盞。生薑五片。棗二個。同煎七分。食前温熱服。量多少與之。海藏云。四君子補脾湯同。

豆蔻散　治吐瀉煩渴。腹脹。小便澀。

舶上硫黃（一分。）　桂府白滑石（三分。）　丁香　荳蔻（各半分。）

右爲細末。每服一字至半錢。米飲調下。無時。

木瓜丸　止吐。

木瓜末　麝香　腻粉　木香末　檳榔末（各一字。）

右同研。麪糊丸如小黃米大。每服一二丸。甘草水下。無時服。

香銀丸　治吐。

丁香　乾葛（各一兩。）　半夏（湯浸七次。切。焙。）　水銀（各半兩。）

右上三味。同爲細末。將水銀與藥研勻。生薑汁丸麻子大。每服一二丸。煎金銀湯下。無時。

藿香散　治脾胃虛有熱。面赤。嘔噦。涎嗽。及轉過度者。

麥門冬（去心。焙乾。秤。）　半夏麴（炒。）　甘草（炙。）　石膏（各半兩。）　藿香（一分。用葉。）

右同爲末每服半錢至一錢。水一中盞。煎七分。食前温服。

辰砂丸　治驚風涎盛、潮熱、及胃熱、吐逆不止。

辰砂研別。水銀炒。砂子各一分。牛黄　龍腦　麝香研別各三錢。生犀末　天麻　白僵蠶酒炒。蟬殼去土。乾蠍炒。毒。麻黄去節。秤。天南星湯浸七次。切。焙乾。各一分。

右爲末再研勻。熟蜜丸棗豆大。朱砂爲衣。每服一二丸。或五七丸。食後服。煎薄荷湯送下。

麻黄湯　治傷風發熱、咳嗽喘急、若無汗者宜服之。

麻黄去節根。寸剉。二錢。以水煮去沫。漉出。控乾。桂去粗皮。二錢。不見火。杏仁泡。去皮尖及雙仁者。七箇。麩炒黄色。別研如膏。甘草炙。一錢。

右爲粗末。入杏膏。拌勻。每服一錢。水六分。煎至四分。去滓。温服。不計時候。以汗出爲度。量兒大小加減。若有自汗者不宜服。

生黄膏　治熱及傷風温壯疳疾、引飲。

雄黄研。甘草末　川甜硝各一分。寒水石生。一分。飛。研。一作一兩。鬱金末一錢。棗荳粉半兩。腦子一錢。

右研爲末。用蜜和成膏。每服一錢。白湯化下。

木香丸

木香　青黛別研。檳榔　豆蔻去皮。各一分。麝香別研。一錢半。續隨子一兩。去殼。蝦蟆三箇。燒存性。

右爲細末。蜜丸棗豆大。每服三五丸。至一二十丸。薄荷湯下。食前服。

胡黃連丸

胡黃連　黃連各半兩　硃砂一分別研

右上二物爲細末研入硃砂末都塡入豬膽內用淡漿煮以杖子于銚子上用線釣之勿著底候一炊久取出研入蘆薈麝香各一分飯和丸如麻子大每服五七丸至一二十丸米飲下食後一作食前又一方用蝦蟆半兩不燒

蘭香散

蘭香葉菜名二錢燒灰　銅青半錢　輕粉一字

右爲細末令勻看瘡大小乾貼之

白粉散

烏賊魚骨末三七　白芨末二七　輕粉一七

右爲細末先用清漿水洗拭過乾貼之無時

如聖丸　治冷熱疳瀉

胡黃連　川黃連　白薇去皮炒各三兩一本作二兩　使君子二兩去皮殼秤　麝香別研半錢　乾蝦蟆五個酒炙熬成膏

右前藥爲末與膏丸麻子大每服人參湯下二三歲五七丸十歲以上十九至十五丸無時

膽礬丸　治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

綠礬須眞者一錢　膽礬爲末一錢　大棗四十個去核　好醋一升已上四物同熬令稠和後藥　使君子二兩去皮　枳實三兩去瓤炒　黃連一兩　訶黎勒去核取一兩　巴豆二十七箇去皮破之已上五味同炒令黑約三分乾入後藥　夜明沙　蝦蟆灰存性各三分　苦楝根皮末各一兩已上三味再同炒候乾同爲末

右同前膏和入臼中杵千下如末成旋入熟棗肉亦不可多恐服之難化太稠卽入溫水可丸卽丸如棊豆大每服二三十丸米飮溫水下不拘時

靑金丹

靑黛研　雄黃飛研　胡黃連兩各半　白附子炮裂二錢　水銀一錢與膩粉同研　膩粉水銀同研　熊膽用溫水化入　蘆薈研　蟾酥研各一分　麝香分半　龍腦研　硃砂飛研　鉛霜一字各

右爲細末令勻用熬過猪膽汁浸蒸餅和丸如黃米大退驚治風化蟲殺疳除百病進乳食治一切驚風天癇目睛上視手足搐搦狀候多端用藥一丸溫水化滴鼻中令噦噴三五次更用薄荷湯下二丸卽愈如久患五疳腹脹頭大四肢瘦小好喫泥土不思乳食愛咬指甲時撏眉毛頭髮稀疎肚上靑筋及又患瀉痢竝用米飮下二丸如鼻下赤爛口齒疳蟲幷口瘡等用乳汁研二丸塗在患處疳眼雀目白羊肝一枚以竹刀子批開入藥二丸在內以麻縷纏定用淘米泔煮熟空腹食之仍令乳母常忌魚腥大蒜雞鴨猪肉等此藥若隔三二日一服永無百疾不染橫夭之疾此古方也錢氏獨麝香比此加倍

止汗散

故蒲扇灰（如無扇用故蒲燒灰）

右研細。每服三錢。温酒調下。無時。

香瓜丸

胡黃連　大黃瓜（黃色者）一個　川大黃（濕紙裹煨至紙焦）　柴胡（去蘆）　鼈甲（醋炙黃）　黃檗（削去粗皮秤）　黃連（蘆酱）　青橘皮（各等分）

右除黃瓜外。同爲細末。將黃瓜割去頭。填入諸藥。至滿。卻蓋口。用杖子插定。慢火內煨熟。將黃瓜及藥同用麪糊丸。如菉豆大。每服二三丸。食後冷漿水或新水下。大者五七丸至十丸。

黃耆散　治虛熱盜汗。

牡蠣（燒）　黃耆　生乾地黃（焙秤）各等分。

右爲末。煎服。不拘時。

虎杖散　治實熱盜汗。

虎杖（剉）

右水煎服。量多少與之。無時。

郁李仁丸　治裩褓小兒。大小便不通。幷驚熱痰實。欲得溏動者。

川大黃一兩去粗皮用實者劉碎酒浸半日住乾炒爲細末　郁李仁一兩去皮　滑石十兩細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲服二三丸更量大小與之以乳汁或薄荷湯下食前

捻頭散　治小便不通

延胡索　川苦楝各等分

右同爲細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量多少與之如無捻頭湯卽湯中滴油數點食前服

生犀散　消毒氣解內熱

生犀凡盜物者皆經蒸煮不堪用須生者爲佳

右一物不拘多少于潛器物中用新水磨濃汁微溫飲一茶脚許乳食後更量大小加減之

三黃丸　治諸熱

黃芩半兩　大黃去皮濕紙裹煨　黃連去鬚各一分

右同爲細末麪糊丸菉豆大或麻子大每服五七丸至十五二十丸食後米飮送下

大黃圓

大黃　黃芩各一兩

右爲末煉蜜丸菉豆大每服五丸至十丸溫蜜水化下量大小以意無時服

龍腦膏　治小兒伏熱在心昏瞀不省或慢服熱藥蓄熱昏昧不知人瘡疹倒陷黑陷

生梅花腦子一字或半字研

右取新殺猪心一個取心中血同研作大丸用新汲水少許化下未省再服如瘡疹陷伏者温酒化下食後服

梔豉飲子　治小兒蓄熱在中身熱燥狂昏迷不食

大梔子仁七箇劈破　豆豉半兩

右用水三盞煎至二盞看多少服之無時或吐或不吐立效

白虎湯　解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母一兩焙秤　甘草半兩剉炒　石膏四兩　白粳米八錢

右同爲粗末每服三錢水一盞煎至八分食後温冷隨意服氣虛人加人參少許同煎

犀角圓　治小兒風熱痰實面赤大小便閉澁三焦邪熱臟腑蘊毒疎導極穩

生犀角作一分半分一本　人參去蘆半兩切　黃連一兩　檳榔半兩　大黃二兩酒浸切片以巴豆去皮一百箇貼在大黃上紙裹飯上蒸三次切炒令黃焦卻去巴豆不用枳實去瓤炙剉一兩或作半兩

右爲細末煉蜜和丸如麻子大每服一二十丸臨臥熱水下未動加數亦治大人孕婦無損

大黃丸　治風熱裏實口中氣熱大小便閉赤飲水不止有下證者宜服之

大黃一兩酒洗過米下蒸熟切片曝乾　川芎半兩剉　甘草一分炙　黑牽牛半兩半生熟炒

右爲細末稀糊和丸如麻子大二歲每服十丸溫蜜水下乳後服以瀉利爲度未利加丸數再服量大小虛實用之

瀉心湯　治小兒心氣實則氣上下行澁合臥則氣不得通故喜仰臥則氣上下通

黃連去鬚一兩

右爲末每服一字至半錢一錢臨臥溫水調下

王海藏云易老單瀉心湯加減法出于此乃實邪也實則泄其子加黃檗爲二聖丸加橘皮爲橘連丸加榆仁爲榆仁丸加黃芩大黃爲三黃丸加阿膠茯苓爲阿膠丸加阿膠當歸乾薑爲駐車丸加木香白附子爲白附子香連丸加訶子木香爲小香連丸加荳蔻木香爲豆蔻香連丸

導赤散　治小兒心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上窻咬牙皆心熱也心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面臥

生乾地黃焙秤　木通　甘草炙各等分

右同爲末每服三錢水一盞入竹葉同煎至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩

桃枝圓　疎取積熱及結胸又名桃符丸

巴豆霜　川大黃去皮　黃檗末各一分　輕粉　硇砂各半錢

右爲細末。麪糊丸。粟米大。煎桃枝湯一晬兒。五七丸。五七歲二三十丸。桃符湯亦得。未晬二三丸。臨臥服。

白餅子（又名玉餅子。）

滑石　輕粉　半夏（湯浸七次。切焙秤。）　天南星（各二錢。爲末。）　巴豆（二十四箇。去皮膜。水一升。煮。水盡爲度。一作水三升。）

右研勻。巴豆後入衆藥。以糯米飯爲丸。小菉豆大。捻作餅子。三歲以上三五餅子。以下一二餅子。煎葱白湯下。臨臥。

紫霜丸

代赭石（二錢。研細。水飛。一本作一錢。）　巴豆（二十一箇。去油心皮膜。）　杏仁（二十一箇。去皮尖。）

右爲細末。飯丸如粟米大。每服三五丸。至十丸。煎皂角仁湯下。無時。海藏云。五色加減。並見活法。

珍珠丸　取小兒虛積。一切聚積。驚涎。宿食。乳癖。治大小便澁滯。療腹脹。行滯氣。

巴豆仁（十四箇。水浸一宿。研極細。）　木香　白丁香（直者。）　丁香（末。各半錢。）　白滑石（末。二錢。）　輕粉（半錢。留少許爲衣。）

右爲末。研勻。濕紙裹。燒粟米飯丸。麻子大。一歲一丸。八九歲以上。至十五歲服八九丸。炮皁子煎湯。放冷下。挾風熱難動者。先服涼藥一服。乳癖者。減丸數。隔日臨臥一服。

消堅丸　消乳癖。及下交妳。又治痰熱膈實。取積。

硇砂（二錢。）　水銀砂子（一兩。皂子大。）　黃明膠（末。五錢。）　巴豆霜　輕粉（各一錢。）　古墨（少許。）

右同研細末。少入麪糊爲丸如麻子大。倒流水下。一歲兒服一丸。食後服。

鐵粉丸　治涎潮盛搐。吐逆。

水銀砂子一錢。　硃砂分。　天南星一分。炮去皮。取末。　輕粉二錢。　鐵粉分。

右同研水銀星盡爲度。薑汁麪糊爲丸粟米大。煎生薑湯下。十九至十五九。二三十丸。無時。

麝蟾丸　治驚風涎熱。潮搐。

龍腦一字。　大乾蟾灰炮二遍。三錢。一作燒灰。秤二錢。　輕粉三錢。　硃砂末七錢。　雄黃末　蛇黃洗淬取末。　青礞石各三錢七。　麝香一錢七。研。

右拌研勻。水浸蒸餅爲丸。如桐子大。硃砂爲衣。薄荷水化下。半丸至一丸。無時。

安蟲散

胡粉炒黃。　檳榔　川楝子去皮核。秤。　鶴蝨炒黃。各二兩。　白礬一分。鐵器內火上煬枯。秤。

右爲細末。每服一字。大者半錢。溫米飮調下。痛時宜服。

五色丸

硃砂研。半兩。　水銀一分。一作二兩。　雄黃一兩。一兩。　眞珠末研。一兩。　鉛三兩。同水銀煉。

右煉蜜丸。麻子大。每服三四丸。煎金銀花薄荷湯下。

鉤藤飮子　治吐痢。脾胃氣熱。虛風慢驚。

鉤藤三分　蟬殼　防風去蘆頭切焙　人參去蘆切焙　麻黃去節　白僵蠶炒黃色　天麻　蠍尾各半兩去毒炒　甘草炙　川芎各一分　麝香一錢別研

右同爲細末每服二錢水一盞煎至六分溫服量多少與之寒多者加附子半錢無時

豆卷散　治小兒慢驚多用性太温及熱藥治之有驚未退而別生熱證有病愈而致熱證者有反爲急驚者甚多當問病者幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒之藥無不效宜此方

大黃豆卷水浸黑豆生芽是也曬乾　貫衆　板藍根　甘草各一兩炙

右四味同爲細末每服半錢水煎去滓服甚者三錢漿水內入油數點煎又治吐蟲服無時

龍腦散

大黃蒸　半夏湯洗薄切用薑汁浸一日焙乾炒　甘草炙　金星石　寒水石　禹餘糧　不灰木　青蛤粉各半兩　銀星石分此味等傳寫缺

右同爲細末研入龍腦一字再研勻新水調一字至半錢量兒大小與之通解諸毒本舊方也仲陽添甘松三兩枚藿香葉末一錢金芽石一分

回生散　治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成慢驚

大天南星重八九錢以上者良

右用地坑子一箇深三寸許用炭火五斤燒通赤入好酒半盞在內然後入天南星卻用炭火三兩

條蓋卻坑子候天南星微裂取出挫碎再炒用熟不可稍生放冷爲細末每服半錢或一字量兒大小濃煎生薑防風湯調下無時

梓朴散

梓州厚朴一兩細剉　半夏一錢湯洗七次薑汁浸半日晒乾

右用米泔三升同浸一百刻水盡爲度如百刻水未盡少加火熬乾去厚朴只將半夏碾爲細末每服半錢或一字薄荷湯調下無時

羌活膏　治脾胃虛肝氣盛生風或取轉過或吐瀉後爲慢驚者亦治寒傷無不效

羌活去蘆頭　川芎　人參切去頭尖　白附子炮　赤伏苓去皮各半兩　天麻　白殭蠶酒浸炒黃　乾蠍去毒炒　白花蛇酒浸去肉焙乾各一兩　川附子炮去皮臍　防風去蘆頭切焙　麻黃去節秤各二錢　肉豆蔻　鷄頭香母丁香也　藿香葉　沉香　木香各二錢　輕粉一字　眞珠末　牛黃各一錢半　龍腦半字　麝香一錢七一本作一錢

右各一分以上七味各研別入雄黃辰砂

右爲細末煉蜜丸大豆大每服一二丸食前薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服性溫故也服無時　古今論鷄舌香者同異紛紛或以爲番棗核或以爲母丁香互相排抵竟無定說季忠以爲最爲易辨所以久無定說者惑于其名耳古人命藥多以其形似者名之如烏頭狗脊鶴虱之類是也番棗核母丁香本二物以其皆似鷄舌故名適同凡藥物名同實異如金櫻地錦之類不足怪也

如鷄舌二種各有主療番棗核者得于乳香中今治傷折藥多用之母丁香卽丁香之老者極芳烈古人合鷄舌香乃此類也今治氣溫中藥多用之所謂最易辨者如此

溫白丸　治小兒脾氣虛困洩瀉瘦弱冷疳洞痢及因吐瀉或久病或慢驚身冷瘈

天麻生半兩　白僵蠶炮　白附子生　乾蠍去毒　天南星剉湯浸七次焙各一分

右同爲末湯浸寒食麪爲丸如棗豆大丸了仍于寒食麪養七日取出未及養七日合成便服之每服五七丸至二三十丸空心煎生薑米飲下漸加丸數多與服之

菰蘞湯　治慢驚

菰蘞根末二錢　白甘遂末一錢

右同于慢火上炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下無時

小惺惺丸　解諸毒治急驚風癇潮熱及諸疾虛煩藥毒上攻躁渴

腊日取東行母猪糞燒灰存性半兩研　辰砂水研飛半兩　蛇黃酉山者燒赤醋淬半兩五番水研飛乾用　麝香　龍腦各二錢　牛黃別研一錢

右以東流水作麪糊丸桐子大用硃砂爲衣二三歲每服二丸鎗匙研破溫水化下小兒初生便宜服一丸除胎中百疾食後服

金箔丸　治急驚涎盛

牛黃　龍腦　麝香各半錢　雄黃　辰砂各一分　生犀末半分　以上六味同研　天南星剉炒熟　白附子炮　防風去蘆頭切焙　半夏湯浸七次切焙乾秤各半兩　金箔二十片

右爲細末薑汁麪糊丸麻子大每服三五丸至一二十丸。人參湯下。如治慢驚去龍腦。服無時。

蟬花散　治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅痛

蟬花拉碎　白僵蠶直者酒炒熟　甘草各一分　延胡索半分

右爲末一歲一字四五歲半錢蟬殼湯調下食後服。

安神丸

麥門冬去心焙　馬牙硝　白茯苓　乾山藥　寒水石研　甘草各半兩　硃砂研一兩　龍腦研一字

右爲末煉蜜丸雞頭大每服半丸沙糖水調下無時。

天南星散　治顱開不合鼻塞不通

天南星大者炮去皮

右爲細末淡醋調塗緋帛上貼顱上火炙手頻熨之立效

瀉白散　肺熱又名瀉

桑白皮炒黃　地骨皮洗去土焙各一兩　甘草炒半兩

右件爲末每服一錢水一中盞入粳米百粒同煎至六分食後溫服。王海藏云治肺熱傳骨蒸。

自汗用此以直瀉之梔子黃芩亦能瀉肺當以氣血分之

益黃散又名補脾散

陳橘皮一兩　青橘皮　訶子肉　甘草切炒各半兩　丁香二錢

右爲細末每服二錢水一盞煎六分食前溫服又有食後

瀉黃散又名瀉脾散

藿香葉七錢　山梔子仁一兩　石膏半兩　甘草三兩一作三分　防風四兩切去蘆焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服一錢至二錢水一盞同煎至五分溫服清汁無時南方多以寒水石爲石膏以石膏爲寒水石正與京師相反乃大誤也蓋石膏潔白堅硬有牆壁而寒水石則軟爛以手可碎外惟青黑中有細紋方書中寒水石則火煆用之石膏則堅硬不可入火如白虎湯用石膏則能解肌熱破痰治頭痛若用寒水石則誤矣又有一等堅白全類石膏而方敲之亦皆成方者名方解石也可代石膏用之南人有不信此說者季忠嘗相與同就京師大藥肆中買石膏寒水石方解石三種又同詣惠民和劑局及訪諸國醫詢之皆合此說乃信服季忠頃編保生信效方已爲辯論恐小兒尤不可惑故復見于此

白朮散

人參去蘆頭切　白朮　木香　白茯苓去皮　甘草炒剉　藿香葉各一兩　乾葛二兩

右爲粗末。每服一錢至二錢。水一盞。煎至五分。溫服。如飲水者。多煎服之。無時。王海藏云。四君子湯加減法。治濕勝氣脫。泄痢太過。與和中散同。

瀉青丸（又名瀉肝丸）

當歸（去蘆頭。切。焙。秤。）　龍膽（焙。秤。）　川芎　山梔子仁　川大黃（濕紙裹。煨。一本無大黃。）　羌活　防風（去蘆頭。切。焙。各等分。）

右爲末。煉蜜和丸鷄頭大。每服半丸至一丸。煎竹葉湯同沙糖溫水化下。王海藏癍疹改誤云。東垣先生治癍後風熱毒翳膜。氣暈遮睛。以此劑瀉之。大效。初覺易治。補肝丸。防風六合湯。四物湯內加防風。羌活等分。細末。煉蜜爲丸。是也。鎭肝丸。瀉青丸去梔子。大黃。治肝虛。

生犀散

生犀（剉。入末。）　地骨皮（自採者佳。）　赤芍藥　柴胡　乾葛（剉。各一兩。）　甘草（半兩。）

右爲粗末。每服一二錢。水一盞。煎至七分。食後溫服。

秦艽散　治潮熱。減食蒸瘦。

秦艽（去蘆頭。切。焙。）　甘草（炙。各一兩。）　乾薄荷葉（半兩。切。焙。）

右爲粗末。每一服二錢。水一盞。煎八分。食後溫服。

地骨皮散　治虛熱潮作。亦治傷寒壯熱餘熱。

知母　柴胡　甘草　人參（切。去蘆。焙。）　地骨皮（自採者佳。）　赤茯苓　半夏（湯洗七次。切。焙。）　各等分。

右爲細末。每服二錢。薑五片。水一盞。煎八分。食後温服。量大小加減。

牛黃膏　治驚熱。及傷風温壯。疳熱引飲。

雄黃研。甘草末。川甜硝各一分。寒水石生飛研。一兩。鬱金末。腦子各一錢。綠豆粉半兩。

右研勻。煉蜜和成膏。薄荷水化下。半皂子大。食後服。

牛黃丸

雄黃研。水飛。天竺黃各二錢。牽牛末一錢。

右同再研。麪糊爲丸。如粟米大。每服三丸至五丸。食後薄荷水下。兼治疳消積。常服尤佳。大者加數丸。

銀液丸　治驚熱膈實。嘔吐。上盛涎熱。

天南星二錢。炮。白附子一錢半。炮。龍腦一錢。輕粉一錢。水銀半錢。作半兩。一本蠍尾二十一枚。炙。去毒。

右同研勻。石腦油丸如綠豆大。每服二三丸。乳香湯下。大者稍加之。無時。

鎮心丸　涼心經。治驚熱痰盛。

甜硝白者。人參切。去蘆末。甘草炙。取末。寒水石燒。一兩。各乾山藥白者。白茯苓各二兩。硃砂一兩。龍腦麝香各一錢。三味并研碎。

右爲末。熟蜜丸鷄頭大。如要紅。入坏子胭脂二錢。卽染胭脂是也。温水化下半丸至一二丸。食後。

軟金丹　治驚熱、痰壅、嗽、膈實。

天竺黃　輕粉各半兩。一本作二兩。　青黛分。　半夏三分。用生薑三分半。搗麵同焙乾。再爲細末。　黑牽牛三分。取末。

右同研勻。熟蜜劑爲膏。薄荷水化下。半皂子大至一皂子大。量度多少用之。食後。

鈎藤膏　治小兒腹中極痛。乾啼後假名盤腸內吊。鄭端友全嬰方名木香膏。

好乳香水中坐乳鉢研細。秤。沒藥研。　木香　薑黃各四錢。　木鼈子仁二十個。去外皮。一本作十二個。

右先將後三味同爲細末。次研入上二味。煉蜜和成劑。收之。每一歲兒可服半皂子大。餘以意加減。煎鈎藤湯化下。無時。次用魏香散。

魏香散

蓬莪蒁半兩。　眞阿魏一錢。

右先用温水化阿魏。浸蓬莪蒁一晝夜。焙乾爲細末。每服一字。或半錢。煎紫蘇米飲。空心調下。

涼驚丸

硼砂研。　粉霜研。　郁李仁去皮。焙乾爲末。　輕粉　鐵粉研。　白牽牛末各一錢。　好臘茶三錢。

右同爲細末。熬梨爲膏。丸菉豆大。龍腦水化下。一丸至三丸。亦名梨汁餅子。及治大人風涎。竝食後。一本無白服牽牛末。

翦刀股丸　治小兒一切驚風。久經宣利。虛而生驚者。

硃砂 天竺黃 研 白僵蠶去頭足炒 全蠍去毒炒 乾蟾去四足并腸洗炙焦黃爲末 蟬殼去頭足一作去翅 五靈脂去黃者爲末用 各一分 牛黃 腦子 各一字 麝香半錢 地黃半兩燒赤醋淬三五遍水研飛

右爲末共二兩四錢東流水煮白麪和丸桐子大每服一丸翦刀鎞頭研破食後薄荷湯下如慢驚卽去龍腦

烏藥散 治乳母冷熱不和及心腹時痛或水瀉或乳汁不好

香附子 破用白者 高良薑 赤芍藥 天台烏藥 各等分

右爲末每服一錢水一盞同煎六分溫服如心腹痛入酒煎水瀉米飲調下無時

紫草散 發癍疹

鈎藤鈎子 紫草茸 各等分

右爲細末每服一字或半錢一錢溫酒調下無時

紫草散 治發瘡辛亥樵隱孫先生出麻疹又發痘瘡黑陷亢拱辰出此方愈亢云錢氏方紫草散有枳殼難服

紫草 甘草 糯米亢云此味極好助胃氣 黃芪 各等分

右爲末水煎服

蟬蛻散 治癍瘡入眼半年以後者一月取效

猪懸蹄甲二兩。入罐子內。鹽泥固濟燒存性。　蟬蛻去土用末一兩。

右二味。研入羚羊角細末一分。拌勻。每服一字。百日外兒半錢。三歲以上一二錢。溫水或新水調下。日三四。夜一二。食後服。一年以外難治。季忠頃守官江南。每置羚羊角。取待山羊角。正如石膏寒水石之相易也。羚羊角纖細而節紋極密。京師做馬人多用以爲馬銜鐵。是也。山羊角粗長。及節紋稀。當是京師用爲正。

三聖丸　化痰涎。寬膈。消乳癖。化驚風食癇諸疳。小兒一歲以內。常服極妙。次有三名。小青丸、小紅丸、小黃丸、總爲三聖丸。

小青丸

青黛分一。　牽牛末分三。　膩粉錢二。

右竝研勻。麪糊爲丸。黍米大。

小紅丸

天南星末一兩。　硃砂半兩。研。　巴豆二錢。取霜。

右研勻。薑汁麪糊丸黍米大。一本。天南星一兩生。

小黃丸

生半夏末分一。　巴豆霜半錢。　黃檗末半錢。

右研勻薑汁糊丸黍米大百日以上者各一丸一歲者各二丸隨乳下之

褊銀丸　治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘粗等

巴豆半兩去皮油心膜研細　古墨八錢火燒淬研　水銀半兩　黑鉛二錢半同水銀結砂子　麝香半錢別研

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸如菉豆大捻褊一歲一丸二三歲二三丸五歲以上五六丸煎薄荷湯放冷送下不得化破更量虛實增減並食後服

百部丸　治小兒肺寒壅嗽微喘

百部炒乾秤　麻黃去節先作末各三分　杏仁四十箇去皮尖麩炒

右和勻熟蜜丸皂子大溫水下二三丸無時日三四服此方仲陽加松子仁五十箇糖丸之含化大妙

銀砂丸　治涎盛膈熱實痰嗽驚風積潮熱

水銀結砂子大三錢　辰砂研二錢　蠍尾去毒爲末　硼砂研　郁李仁去皮焙秤爲末　粉霜研各一錢　鐵粉　好蠟各一錢

右同爲細末熬梨汁爲膏丸如菉豆大龍腦水化下一丸至三丸亦名梨汁餅子及治大人風涎並食後服

溫中丸　治小兒胃寒瀉白腹痛腸鳴吐酸水不思食霍亂吐瀉諸疾

人參去蘆　甘草炮　白朮各一兩

右薑汁麪糊丸如綠豆大。米飮下一二十丸。不拘時服。

二氣散　治虛實冷熱。霍亂吐逆。

硫黃不夾石者。半兩。研細　水銀一分。與黃再研。

右同研。如黑煤色。不見星。每服一字至半錢。用生薑水調下。不以時候。童兒大小加減。此散浮泛難沈。先滴少水。以指緩緩研之。稍稍增湯。使調之。及治大人小兒一切吐逆。諸藥不效者。

白附子香連丸　治腸胃氣虛。暴傷乳哺。冷熱相雜。瀉痢赤白。裏急後重。腹痛扭撮。晝夜頻併。乳食減少

黃連　木香各分。□　白附子尖二箇。

右爲末。粟米飯丸綠豆大。或黍米大。每服十丸。至二三十丸。食前淸米飮下。日夜各四五服。

荳蔻香連丸　治泄瀉不拘寒熱赤白。陰陽不調。腹痛腸鳴。立效如神。

黃連三分，炒。　肉荳蔻　南木香各分。一

右爲細末。粟米飯丸米粒大。每服米飮下十丸至三二十丸。日夜各四五服。食前。

小香連丸　治冷熱腹痛。水穀利滑。

木香　訶子肉各一錢。　黃連半兩。炒。

右爲細末。飯和丸綠豆大。米飮下十丸至三五十丸。頓服之。食前。

大胡連丸　治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米不思飲食多睡吼哽臟腑或祕或瀉肌膚黃瘦毛焦發黃飲水五心煩熱能殺蟲消脹進飲食兼治瘡癬常服不瀉痢

胡黃連　黃連　苦楝子（各一兩）　白蕪荑（去扇半兩）　乾蟾頭（燒存性別研一分）　麝香（別研一錢）　青黛（一兩半別研）　蘆薈（一分別研）

右先將前四味爲細末猪膽汁和爲劑每一胡桃大入巴豆仁一枚置其中用油單一重裹之同米一升許蒸米熟爲度入後四味爲丸少入麪糊丸

麝香丸　治小兒一切驚疳等病

草龍膽　胡黃連（各半兩）　木香　蟬殼（去頭足洗各一錢爲末乾秤又一本作去劍各一分）　瓜蔕　龍腦　麝香　牛黃（各一錢並各自研）

右藥爲細末和猪膽汁丸桐子及菉豆大驚疳臟腑或祕或瀉清米飲或温水下小丸五七粒至一二十粒疳眼猪肝湯下疳渴鵝猪湯下猪肉湯下亦得驚風發搐眼上薄荷湯下一丸更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼蟲痛苦楝根或白蕪荑湯送下百日內小兒大小便不通水研封臍中有蟲加乾漆好麝香各少許幷入生油一兩點温水化下一大丸病急則研碎緩則浸化小兒虛極慢驚者勿服尤治急驚痰熱此方內一本瓜蔕用二十一箇爲末更用蘆薈去沙秤熊膽青黛各一分輕粉一錢

大惺惺丸　治驚疳百病及諸壞病不可具述

辰砂研　青礞石　金牙石各一錢半　雄黃一錢　蟾灰二錢　牛黃　龍腦各一字別研　麝香半錢別研　蛇黃三錢醋淬五次

右研勻細末水煮蒸餅爲丸硃砂爲衣如菉豆大百日兒每服一丸一歲兒二丸薄荷湯化下食後

獨活飮子　治腎疳臭息候良方

天麻　木香　獨活　防風各一錢　麝香少許研細

右每服一錢匕小者半錢麥門冬熟水調下

三黃散　治腎疳崩砂候良方

牛黃　大黃　生地黃　木香　靑黛各等分爲末

右每服一錢匕熟水調服

人參散　治腎潰槽候良方

肉荳蔻炮　胡黃連　人參　杏仁炒　甘草炙各等分爲末

右每服一錢匕小者半錢溫熟水調服

檳榔散　治腎疳宣露候良方

木香　檳榔　人參　黃連　甘草炙各等分爲末

右每服一錢。小者半錢。熟水調服。

黃芪散　治腎疳腐根候良方。

黃芪蜜炙。牛黃　人參　天麻　蠍去毒。杏仁炒。白茯苓　川當歸　生地黃洗。熟乾地黃洗。各等分爲末。

右每服。小者半匕。煎天門冬熟水調服。麥門冬亦得。

地骨皮散　治腎疳齦齶牙齒肉爛腐臭鮮血常出良方。

生乾地黃半兩。眞地骨皮　細辛各一分。五倍子二錢。炒令黃。

右爲末。每用少許傅之。頻與功效多不妨。議曰本經所載疳證有五。謂五臟所受。故得其名。今述腎疳一臟有五證候者。最爲要急。不可同常。此疾其陳有五種候傳。迅疾可畏。乃知走馬之號不誣。初發之時。兒孩口臭。上干胃口。氣息臭穢。漸進損筋。齦肉生瘡。或腫或爛。其齒焦黑。又進從牙槽內發作瘡疱。破潰膿爛。又進熱逼入脈。常血出。其熱注久。牙齦腐壞。槽寬齒脫。六七歲孩。落盡不復更生。豈可治療。今以妙方宜速與。隨其傳變而理。不待疾作而後藥也。

龍骨散　治疳口瘡走馬疳。

砒霜一字。粉霜半錢。龍骨一錢。定粉半錢。龍腦半字。蟾酥一字。

右先研砒粉極細。次入龍骨再研。次入定粉等同研。每用少許傅之。

蘭香散　治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂出血齒落者

輕粉　蘭香末各一錢　蜜陀僧半兩醋淬爲末

右研如粉傅齒及齦上立效　議曰嬰孩受病證候多疳良由氣鬱三焦疳分五臟內有腎經常虛得疳名之曰急以走馬爲喻治療頗難此等證初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齦爛名曰潰槽又盛血出名曰宣露重則齒自脫落名曰腐根其根既腐何由理之嗟乎豪家育子餔以甘肥腎堂受之虛熱或因母在難月恣食厚味令兒所招俱非偶然而作今將祕方述于後

傅齒立效散

鴨嗉膽礬一錢煅上紅研　麝香少許

右研勻每以少許傅牙齒齦上又一方用蟾酥一字加麝香和勻傅之　議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也變蒸足後飲食之間深恐有傷于榮衛而作衆疾其或氣傷于毒血傷于熱熱毒攻之虛臟所受何臟爲虛蓋小兒腎之一臟常主虛不可令受熱毒攻及腎臟傷乎筋骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬非徐徐而作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立效散及麝酥膏傅之切忌與食熱毒之物此疳不同常證醫宜深究保全爲上若用常方難于痊愈

胡黃連麝香丸　治疳氣羸瘦白蟲作

胡黃連　白薇去扇各一兩半　黃連　木香各半兩　辰砂一分別研　麝香一錢別研

右爲細末麪糊丸蔡豆大米飲下五七丸至十丸三五歲以上者可十五丸二十丸無時

大蘆薈丸　治疳殺蟲和胃止瀉

胡黃連　黃連　白薑黃去扇秤　蘆薈　木香　青橘皮　雷丸破開白者佳赤者殺人勿用　鶴蝨微炒各半兩　麝香二錢別研

右爲細末粟米飯丸蔡豆大米飲下一二十丸無時候服神效忌一切甜物

榆仁丸　治疳熱瘦悴有蟲久服充肥

榆仁去扇黃連去鬚各一兩

右爲細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入椀內甑上蒸九日每日一次候日數足研麝香半錢湯浸宿蒸餅同和成劑丸如蔡豆大每服五七丸至一二十丸米飲下無時

橘連丸　治疳瘦久服消食利氣長肌肉

陳橘皮一兩黃連一兩半去鬚米泔浸一日

右爲細末別研入麝香半錢用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟爲度取出以粟米粥和蔡豆大每服十九至二三十九米飲下量大小與之無時

龍粉丸　治疳渴

草龍膽　定粉微炒　烏梅肉焙秤　黃連各二分

右爲細末。煉蜜丸麻子大。米飮下一二十丸。無時。

二聖丸　治小兒疳。臟腑或好或瀉。久不愈。羸瘦成疳。宜常服。

川黃連（去鬚。一兩。）　黃檗（去粗皮。一兩。）

右爲細末。將藥末入猪膽內。湯煮熟。丸如菉豆大。每服二三十丸。飯飮下。量大小加減。與服無時。

沒石子丸　治小兒泄瀉白濁。及疳痢滑。肛門痛。

木香　黃連（各二錢半。）　沒石子（一箇。）　荳蔻仁（二箇。）　訶子肉（三箇。）

右爲細末。飯和丸如麻子大。米飮下十五丸。量大小加減服之。

金華散　治小兒一切濕瘡癬疳。

黃檗　黃連（各半兩。爲細末。）　黃丹（一兩。水飛。）　輕粉（一錢。）　麝香（一字。別研。）

右同研勻。先以温水洗。後貼之。

蚵蛖丸　治小兒五疳八痢。乳食不節。寒温調適乖違。毛髮焦黃。皮膚枯悴。脚細肚大。顱解胸陷。漸覺尪羸。時發寒熱。盜汗咳嗽。腦後核起。腹內塊生。小便泔濁。膿痢澁青。撏眉咬指。喫土甘酸。吐食不化。煩渴併頻。心神昏瞀。鼻赤脣燥。小蟲既出。蛔蟲咬心。疳眼雀目。名曰丁奚。此藥效驗如神。

蚵蛖（酒浸去骨焙。）　白蕪荑（去皮。）　黃連（去鬚。）　胡黃連（各一兩半。）　青黛（半兩。爲衣。）

右件。研爲細末。猪膽汁麪和丸如粟米大。每服三十丸。用飯飮吞下。食後臨臥。日進三服。

白玉散

白玉分一　寒水石半兩

右爲末用米醋或新水調塗



顱顖經

撰人不詳

本館據函海本排印初編各叢書僅有此本

顱顖經卷上

宋闕名撰

脈法

凡孩子三歲已下呼爲純陽元氣未散若有脈候卽須於一寸取之不得同大人分寸其脈候未來呼之脈來三至吸之脈來三至呼吸定息一至此爲無患矣所言定息呼氣未出吸氣未入定息之中又至此是平和也若以大人脈五至取之卽差矣如此七至已上卽爲有氣或脈如弓之張弦此爲有氣並可依後方合藥治之或七至已下此爲冷候亦宜依後方合藥療之或診候取平或忽而不見沉浮不定伏益根平者此爲神鬼之病且合求祟續宜使藥或桃柳枝湯浴煎飲子爲使一兩顆桃心

孩子脈呼吸十五至已上三至以下皆死矣

病證

初生小兒鵝口撒噤並是出胎客風着顱臍致有此可以小艾三壯及烙之愈

初生小兒至夜啼者是有瘀血腹痛夜乘陰而痛則啼

初生小兒一月內乳痢如膠是母寒氣傷胃所致也

初生小兒一月內乳痢如血是母胃有滯熱所作也

初生小兒一月內兩眼赤者亦在胎之時母喫炙煿熱麵壅滯氣入胎中熏兒腦所致也

小兒溫熱。皆因從氣實而搏胃氣。然若下之。平氣即愈。氣虛則生驚而變癇。小兒驚癇。一從虛邪客熱相搏而生。其後當用補養安和即愈。加以性冷及太過即死。小兒噦逆吐。皆胃氣虛。逆氣客於藏氣而作。當和胃養氣。至下如冷即極。小兒霍亂吐逆。皆胃氣與陰陽氣上下交爭而作。當用分和補藥調養。即愈。餘皆死。小兒客忤無辜。皆因客入所觸。及暴露星月。小兒嫩弱。所以此候多惡。

小兒一、眼青揉癢。是肝疳。二、齒焦。是骨疳。三、肉色鼻中乾。是腑疳。四、皮乾肉裂。是筋疳。五、髮焦黃。是血疳。六、舌上生瘡。是心疳。七、愛喫泥土。是脾疳。孩子肌骨肥實。皮膚白。無故煩渴。此是小時妳猛衝損肺。但依後方內用甘草八參合飲之。若氣急甚。胷脹起。鼻連眼下臉青色。呻吟之聲者。此必死之兆。不得與藥。

孩子利如泔淀者。難救。利如鵝鴨血者。脾已爛損。不宜與藥。

孩子凡有諸色疾苦。但眼臉下垂牽。必定死矣。

孩子瘧。皆難救。或發無時。即口噤咬牙作聲。此必死矣。呼爲瀝瘠疳瘧。亦名爲鎖腸疳。

孩子渴。喫乳食。夜啼作聲。此即是腹肚痛。

孩子無故搖頭。此是惱頂痛。

孩子喫乳食。皆出。此是脾冷。

孩子無故肚大頂細。四肢消瘦。筋脉骨節起。自是小來少乳。嚼食與喫。早成骨熱疳勞。先宜與保童丸喫。

續與柴胡鱉甲飲。（保童丸方見一切疳門中。柴胡飲子方見行遲門中。）

孩兒頭面胷膊肌厚。臂脛細瘦。行走遲者。是小持也。損。

孩子鼻流清涕。或鼻下赤痒。此是惱中鼻中疳極。宜用後方青黛散。吹鼻。兼傅下赤爛處。（方見疳疾吹鼻門中。）

已前並診候孩子疾狀。孩子氣脉未調。藏府胞薄。腠理開疎。看脉以時。依方用藥。

孩子或夏中熱時。因乳母沐浴。多使冷水。妳得冷氣。血脉皆伏。見孩兒氣未定。便與妳使孩子多胃毒。及赤白兩般惡痢。此乃是妳母之過。凡浴後。令定息良久。候氣定。揉與之。即令無患。

師巫燒錢。乳母須預祝之。勿令着水噴兒。皆令驚熱入心。轉成患害。切細愼之。

凡孩子自生。但任陰陽推移。即每六十日一度變蒸。此骨節長來。四肢發熱。或不下食。乳遇如此之時。上唇有珠子。如粟粒大。此呼爲變蒸珠子。依後方退熱飲子療之。不宜別與方藥。（幼幼新書註云。顱顬以下六十日爲一變。巢氏病源以三十二日爲一變。說有不同。故兼存之。）

驚癇癲證治

牛黃丸　治小兒胎驚及癇。或心熱。

牛黃　龍齒　馬牙硝　鐵焰粉　各等分

右爲細末。鍊蜜丸如梧桐子大。每日乳食前。熱水調破一丸。灌下。令母忌口。

又牛黃丸　治孩子驚熱入心。擬成癇疾。面色不定。啼哭不出。潮熱無度。不吃乳食。大段眼翻露白。手足逆冷。呼喚不應。

牛黃研　大黃　獨活各一分。
升麻　琥珀炙別研　大麻二別研各兩。

右爲末。蜜丸如梧桐子大。空心熱水下一丸。頓服之。食後再服一丸至十。於閣各金銀箔各五片。忌煿炙毒物。

虎睛丸　治孩兒風癇。驚啼不吃乳。

虎睛隻　犀角　子芩各等分
梔子仁　大黃各十分

右五味爲細末。鍊蜜丸如梧桐子大。驚啼不吃妳乳汁下七丸。風癇米飲下五丸至七丸。小兒減丸數。取利爲度。忌毒物。若有虛熱。加知母六分。

又虎睛丸　治小兒孩子二十四種驚癇。壯熱。抽掣腳手。嘔吐。夜啼。眼腫。

虎睛二隻。聖惠用一對。　梔子仁　茯苓各二分。
牛黃少許。聖惠用一兩。　大黃各四分　犀角末一分。聖惠用二味。
人參用一分。聖惠用一兩。　鈎藤四分　黃芩用一分。聖惠用一兩。

蛇退七寸燒灰聖惠用一分

右爲末蜜丸如黍米大空心熱水下隨年丸輕者一服重者三服妳汁下亦得聖惠熱水下忌妳母一切生冷油膩毒物

痢疾方　治孩子鷄癇不知迷悶嚼舌仰目

牛黃一大豆

右爲細末研和蜜水服之

二十味虎睛丸　治孩子從一歲至大癲發無時口出白沫小便淋瀝不和

虎睛一隻生眼生煤乾酒浸令黃色　眞珠　蜂房各三錢

麻黃去節二分　鈎藤三分　鐵精

防葵　大黃　子苓

龍齒　銀肖　梔子仁

羌活各四分　柴胡　升麻

白鮮皮　雷丸燒令赤　人參各二分

細辛一分半　蛇皮五寸炙　石膏五分

蚱蟬四枚去足炙

右爲末蜜丸如赤豆大四五歲五丸日再服大兒十丸濃煎米飲下忌生冷油膩

疳痢證治

保童丸　治小兒孩子諸色疳候。或腹內虛脹。驚癇、頭髮立。常咬手指、脊疳、脊勞、臂脛細弱。仍立不得。及鼻下常赤。清涕、涎流不止。舌上生瘡。腦疳、口疳、腹上筋脈

虎睛半隻　硃砂　麝香各一錢

牛黃　龍腦　巴豆

芎藭　桔梗　枳殼

檀香　茯神　人參

當歸　羌活　代赭

雞風　白朮兩各半

右爲細末。下香砂巴豆勻。鍊蜜丸如梧桐子大。一歲至五歲。每日一丸。十歲每日兩丸。並空心米飲下。但稍知孩子病甚。卽加藥與之。孩子未較。妳母忌生冷油膩。炙煿毒魚。大蒜米醋。

又方　治孩子疳痢。諸色疳幷一十五種病狀。一腹大。二皮膚黑黃。三骨節麁。四眼赤。五口赤。六鼻中生瘡。七頭髮黃。八咬指甲。九愛喫土。十愛喫甜食。十一身熱。十二頭大。十三臍凸。十四項細。十五面無光。並宜常服保童丸方。

硃砂半分　牛黃　麝香

蟾酥各少許　阿魏二分

右先將硃砂於淨器中研如粉。入諸藥。一時以蒸餅爲丸。忌羊血等。

又方　治孩子疳氣。或釀肚脹。上筋脉頭大項細。喫物不知足。夜中卽起。腹內長鳴。

大黃一兩　陳橘皮浸二兩　醋二合　蜣螂二十個去翅足子熱燒醋安之以杯蓋地上去火毒候冷取出炒過　阿魏如硃砂大

右爲末。蜜丸如梧桐子大。每日空心熟水下十丸。忌如常。

紫雪圓方　治小兒五疳。兼腹脹。虛脹。疳氣煩悶。或時燥渴。

大黃　黃連　代赭各二分　硃砂半石連大　麝香各少許　杏仁去皮尖別研　肉豆蔻　巴豆去皮以冷水浸別研各一兩　蝙蝠血三二滴　蟾酥少許

右爲細末。蜜丸如赤豆大。每服空心米飲下一圓。五歲十歲只可服五丸。臨時加減。忌冷水油膩炙煿。

硃砂丸　治孩子疳痢。辨蟲顏色。定吉凶。

右爲細末。蜜丸如赤豆大。每服空心米飲下一圓。五歲十歲只可服五丸。臨時加減。忌冷水油膩炙煿。

右爲細末。和少許口脂調。先以桃柳枝煎湯浴兒後。看小兒大小。以棗豆大填兒臍中。後用紙片可臍

中貼之。用青衣蓋兒。看蟲出來。黃色輕。青黑色重。

青黛散　治孩子鼻流清涕。或鼻下赤瘡。

青黛一錢。　蘆會半錢。　地龍半錢。
硃砂一字　瓜蒂半錢。　細辛一錢。
硃砂七。
宣連半錢。

右爲細末。和合。吹鼻中。入麝香少許。

保童丸

硃砂　麝香　新蟾酥各等分。

右研合成劑。合子內盛。丸如麻子大。又於一合子內。浸一丸。以筋頭點入鼻中。亦名問命丸。但孩子病甚。卽與吹之。或得七噴。可以治之。五噴卽甚。三兩噴必死矣。此不可深著水浸。臨時入水亦不畏。

蓋腦丸　治孩子腦疳鼻瘡。毛髮作穗。面色赤。

地榆炙。　蝦蟆燒各一分。　蝸牛殼二十個。
青黛　石蜜各二分。　麝香二大豆許。

右爲末、吹鼻。當有黃水出。忌甜物。

胡黃連丸　治孩子熱疳。

胡黃連　蟾酥各等分

右爲末蜜丸如菉豆大五歲熟水送下二丸

調中丸　治孩子諸疳或熱攻衝心肺氣急晝夜有汗日漸羸瘦不吃乳食

柴胡　茯苓　人參

木香　桂心　大黃濕紙裹煨

枳殼麵炒去皮瓤　甘草炙　鱉甲醋炙各等分

右爲末蜜丸如梧桐子大每歲兩丸至五歲三丸熱熟水下忌如常

地黃煎方　治孩子疳勞肺氣熱欬嗽四肢漸瘦心肺乾

生地黃汁五兩　酥　生薑汁

蜜各一兩　鹿角膠半兩

右先將地黃汁安鍋內慢火煎手不住攪約五六沸下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎候如稀餳卽住火每食後兩度共與一匙頭忌毒物

又方　治孩兒疳蝕口齒齒齦宣露臭穢不可近

葶藶炒　梧桐律等分

右爲末以臘月猪油調微煎作膏取柳木筋子綿裹微微搵藥時烙

又方　治孩子疳蝕脣鼻及諸瘡

硫黃　乾漆　文蛤

右等分燒灰稍煙盡研爲末入麝子少許以帛拭瘡濃血後用藥乾摻之立效

又方　治孩子初患諸色痢及微有疳氣

右藥不限多少炒令黑拗破看內外相似爲散空心米飲下半錢以歲加減服之忌如常

又方　治孩子赤白痢

阿膠　赤石脂　枳殼麩炒

龍骨　訶子炮半熟去核各半兩　白朮分一

右爲末一歲二歲空心米飲下半錢

又方　治孩子冷毒疳痢白濃疳靛瘦弱不喫食腹痛

青木香分一　黃連半兩

右爲末蜜丸如梧桐子大一歲以上空心熟水下一丸三歲五歲服二丸藥性熱者不宜多服忌生冷

溫脾散　治孩子水瀉利并脾冷食乳不消喫乳頻吐

乾薑　甘草炮剉各半兩　附子　白朮一兩

右爲末空心米飲下半錢忌鮮魚毒物

火丹證治

黃帝問岐伯曰後生少稚多被惡疾丹毒二品若何分之岐伯曰陽解百年一十以上爲毒一十已下爲丹丹毒一也隨其大小分別之治之有毒至依方萬無一差喻人間男女皆遭丹毒至依此枉死者復何限哉良由信邪師之語仍被恐之愚昧之人勿與下手請依方用今出此圖形狀如後按此圖今佚

伊火丹從兩脇起

神竈丹從肚起

尿竈丹從踝起

胡吹竈丹從陰囊上起

天火丹從腹背遍身起

天雷丹從頭頂起

熛火丹從背甲起

胡漏竈丹從臍中起

廢竈丹從曲臂起

神氣丹從頭背上起

土竈丹從陰裸起。
朱黃丹赤豆色遍身上起。
螢火丹從耳起。
野竈丹從背脊起。
鬼火丹從面上起。
伊火丹從兩脇起。
右用猪糞燒灰并鐵槽中泥拌調塗之日三。
神竈丹從肚起。
右用土蜂窠杏仁臘粉生油調塗立差。
尿竈丹從踝起。
右用屋四角頭茅草燒灰使雞子白調塗之。
胡吹竈丹從陰囊上起。
右用水茄窠下泥和苦酒塗之。
天火丹從腹背遍身起。
右用樺皮白末和生油調塗之亦用赤石脂羊脂調塗之。

天雷丹從頭項起。

右用陰乾葱末拌赤脂塗。又用竈下土雞子白調塗。

胡漏竈丹從臍中起。

右用屋漏水調竈中土塗之。

廢竈丹從曲臂起。

右用屋四角茅草灰鷄子白調塗之。

神氣丹從頭背上起。

右用牯牛骨燒灰羊脂塗之。

土竈丹從陰蹊起。

右用屋四角茅草竈橫麻、及鷄子白、調塗之。

朱黃丹赤豆色遍身上起。

右用愼火草擣汁和酒調塗之。

螢火丹從耳起。

右用愼火草擣汁塗之。

野竈丹從背脊起。

右用柔香茸蒴攪赤小豆末塗之立差。

鬼火丹從面上起。

右用竈下土鷄子白調塗之立差。

雜證

平和飲子　治小兒初生可日與之。

人參　茯苓　甘草炙。

升麻已上各一分。

右以水一白盞煎至一合半。已來時時與之。乳母忌食油膩。滿月及百晬以來加之。臨時冷加白朮。熱加黄芩各半錢。

又方　治孩子臍中不乾。

白礬一錢煅過。　龍骨一分。

右爲細末。入麝香少許。每次使拭臍乾。摻之。用帕裹避風。

青木香散　治孩子陰囊或如疝腫脹。

狐陰一雙炙。　蒺藜炒。

昆布　枳殼　地膚子　槐子炒各一分。

右爲末一歲二歲空心米飲下一錢
又方　治孩子蛔蟲咬心痛面伏地臥口吐清水痰涎
檳榔　苦楝根　鶴蝨炒各半兩
右爲末空心熱茶下一錢以意加減忌粘食
杏仁丸　治孩子或渴此是蛔蟲傷
杏仁去皮尖　腻粉各分
右爲末每用唾丸空心米飲茶任下二丸
又方　治孩子赤遊腫或如丹煩渴渾身赤瘤壯熱
菉豆粉　鉛白霜
右細研雞蘆汁調塗之
又方　取鉛霜法將鉛來於石上打令薄掘地作坑可鉛片大以杵擣坑實滿坑着醋以鉛蓋定經一宿去取霜如珠子大和藥使之如煩渴以後服解熱飲子
又方
麥門冬　小蘆根　竹葉
乾葛搗末　漏蘆　犀角屑各等分

右用水四合半。令煎一合。無問食前後。徐徐與之。

消石散　治孩子身上無故腫。但覺肉色赤熱。

消石　大黃　蔡豆各等分。

右爲末。每用時。隨腫大小。取菩薩根研汁。調塗腫上。如有惡物。卽看有點子。以膏貼之。四面以散子燔之。若無菩薩根。卽用雞子白或車前根葉亦得。

又方　治孩子胎中受風。長後或滿身生瘡。痱癢如疥癩。或如飲飽痒瘡。

葱白　硝　臭黃

琉黃各等分。

右用油半兩。燒令熱。下少許蠟。先剁葱白三莖。細切。待油熱。卽潑葱上。細研。續下琉黃、臭黃、硝、更研之。旋塗。

茴香散　治孩子赤眼。幷胎熱及疳障多淚。

茴香　冬青膽陰乾。　生甘草各等分。

右爲細末。每洗眼時。取藥一分。水一盞。煎一二沸。後溫洗之。或孩兒長大。卽加藥幷水。

引子方　孩兒用藥洗眼後。可更服之。

知母　黃芩　青箱子

地蒲子　秦皮　車前子
山梔子　獨活各等分
右藥以水五合煎二合去滓溫服忌食如常
又方　治孩子睛耳
白礬半兩燒過　龍骨　鉛丹燒各一分
麝香少許
右爲末以綿裹竹枝子淨探濃水以一小豆大藥傳之別以綿裹塞愼之勿令見風
又方　治小兒睛耳
石硫黃製
右爲細末以摻耳中日一夜一
又方　治孩子小便不通
茯苓　通草　冬瓜子
車前子各等分
右以水四合藥二兩煎一合半作二服忌油膩
側栢散　治孩子風熱

側栢　鬱金　乾蝎
天南星　子芩　大黃已上各半兩

右爲末。治風及驚。溫酒下。退熱。每夜熟水下半錢。

柴胡飲子　治小兒行遲。小兒傷抱。腳纖細無力。行止不得。或骨熱疳勞。肌肉消瘦。

柴胡　鱉甲米醋塗炙　知母
桔梗　枳殼麵炒去瓤　元參
升麻

右藥等分。並細剉。每日煎時。三歲以下。取藥半兩。水五合。煎二合。去滓。分二服。空心食前後各一服。忌毒物。飲後用澡浴方。

澡浴方

苦參　茯苓皮　蒼朮
桑白皮　白蘞各半兩　葱白少許

右藥剉細。每浴時。取一兩。沸水三升。浸藥後。通溫。與兒浴之。避風於溫處。妙。

又方　治小兒數歲不能行。取斐家未開戶盜其飯食來以哺之。不過三日便起行。勿令人知之。

王雲五主編

叢書集成初編

小兒藥證眞訣及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者張嘯天王永榜）

G一六一六上 張朱